

THE NEW YORK • BOTANICAL GARDEN
1891
PRO SCIENTIA
POPULIQUE
SALUTE
LIBRARY



CATALOGUE DES PLANTES

OBSERVÉES AUX

ENVIRONS D'ANVERS

PAR

H. VAN DEN BROECK



GAND
IMPRIMERIE C. ANNOOT-BRAECKMAN, SUCC. AD. HOSTE

1883

A Monsieur le Frère [illegible]
des Ecoles Chrétiennes,
hommage de l'auteur.

CATALOGUE DES PLANTES

OBSERVÉES AUX

ENVIRONS D'ANVERS

PAR

H. VAN DEN BROECK

GAND
IMPRIMERIE C. ANNOOT-BRAECKMAN, SUCC. AD. HOSTE

—

1883

CATALOGUE DES PLANTES OBSERVÉES AUX ENVIRONS D'ANVERS.

Depuis 1875, j'ai exploré assidûment les environs d'Anvers, dont la florule est encore trop peu connue. C'est ce qui m'a décidé à publier ce catalogue.

Comme je ne m'occupe de bryologie que depuis une couple d'années, je n'ai pu, dans ce court espace de temps, que jeter un rapide coup d'œil sur la florule bryologique de cette contrée. J'espère pouvoir plus tard compléter la liste des Muscinées que je publie aujourd'hui.

Les localités situées sur la rive droite de l'Escaut que j'ai explorées, sont limitées au nord, par la Hollande; à l'ouest, par l'Escaut; au sud, par le Rupel, le canal de Louvain et la province de Brabant jusqu'à Rymenam et à l'est, par Wuestwezel, Brecht, St-Job in 't Goor, Schilde, OEleghem, Viersel, Nylen, Lierre, Wavre-Ste-Catherine, Bonheyden et Rymenam. En dehors des limites que je viens de tracer, j'ai exploré les localités de Willebroeck, Herenthals, Oolen, Gheel, Thielen, Gierle, Vosselaer et Turnhout et en outre la rive gauche de l'Escaut de Burght à Calloo.

La ville d'Anvers est située aux confins de trois zones, qui sont les *zones campinienne*, *poldérienne* et *maritime*.

La *zone maritime* s'étend le long des deux rives du Bas

Escaut. Elle disparaît vers Burght, sur la rive gauche et entre Anvers et Hoboken, sur la rive droite. La *zone poldérienne* touche immédiatement à la *zone maritime* et vient aboutir, sur la rive droite de l'Escaut, à la *zone campinienne* vers Santvliet, Stabroeck, Hoevenen, Eeckeren, Merxem et Hoboken.

Je vais esquisser à grands traits l'aspect de la contrée. Elle forme une vaste plaine dans laquelle se rencontrent quelques dunes dans la zone campinienne.

Les deux rives du Bas Escaut, bordées de bas-fonds et de prairies, constituent la *zone maritime*. Sa florule ne se compose que d'un petit nombre d'espèces, qui par contre s'y trouvent souvent largement représentées. Les plus intéressantes sont :

Aster Tripolium L. (1).
Triglochin maritima L.
Plantago maritima L.
Halimus portulacoides Wallr.
Rumex palustris Sm.
Suaeda maritima Dmrt.
Salicornia herbacea L.
Spergularia salina Presl.
— marginata Bor.
OEnanthe Lachenalii Gmel.
Armeria maritima Willd.
Artemisia maritima L.
Glyceria maritima Wahlberg.
Hordeum maritimum With.

Quelques autres espèces y sont très-rares. Telles sont : *Ruppia maritima* L., *Spartina stricta* Roth, *Lepturus filiformis* Trin., *Halimus pedunculatus* Wallr., *Sonchus palustris* L., *Zostera nana* Roth, etc.

La *zone poldérienne* est couverte de champs cultivés et de prairies entrecoupés de fossés. On y trouve aussi quelques étangs. Les bois y sont inconnus. La végétation de cette zone est des plus curieuses à étudier. Certaines espèces,

---

(1) Quelques-unes de ces espèces existent aussi dans la zone poldérienne.

communes ou assez communes en Campine, y font complètement défaut. Parmi celles-ci, je puis citer :

Anemone nemorosa L.	Cirsium palustre Scop.
Melampyrum pratense L.	Ornithopus perpusillus L.
Stellaria Holostea L.	Rhamnus Frangula L.
Alchemilla arvensis Scop.	Lysimachia vulgaris L.
Calluna vulgaris Salisb.	Teucrium Scorodonia L.
Ajuga reptans L.	Jasione montana L.
Campanula rotundifolia L.	Filago minima Fries.
Hieracium umbellatum L.	Holcus mollis L.
Luzula campestris DC.	Festuca ovina L.
Nardus stricta L.	Pteris aquilina L.
Asplenium Filix-femina Bernh.	Polystichum spinulosum DC.
Sarothamnus scoparius Koch.	Deschampsia flexuosa Nees.
Euphrasia officinalis L.	Potentilla sylvestris Neck.

D'autres espèces, pour la plupart moins communes, existent dans la zone poldérienne, tandis que je ne les ai pas encore observées dans la zone campinienne. C'est principalement le cas pour les suivantes :

Galium tricorne With.	Lactuca saligna L.
Spergularia salina Presl.	Salicornia herbacea L.
Lathyrus tuberosus L.	Triglochin maritima L.
Trifolium fragiferum L.	Zannichellia palustris L.
Apium graveolens L.	Juncus obtusiflorus Ehrh.
Torilis nodosa Gärtn.	Agropyrum pungens R. et S.
Glaux maritima L.	Veronica polita Fries.
Centaurea Calcitrapa L.	Aster Tripolium L.
Senecio erucaefolius L.	

Les champs cultivés occupent une grande partie de la *zone campinienne*. Les bois de pins y sont fréquents. Viennent ensuite les bois de chênes, de hêtres, de peupliers et d'autres essences. Aux environs de Calmpthout, au nord d'Anvers et à l'est de cette ville vers Gheel, il y a d'immenses bruyères, parsemées de mares et de marais. Des rivières

souvent bordées de prairies et quelques cours d'eau de peu importance sillonnent la zone qui nous occupe.

Je prie mes savants collègues qui m'ont offert leur utile concours, de recevoir l'expression de ma vive reconnaissance. C'est avec plaisir que je mentionne spécialement M. le curé J. Blox, qui m'a guidé quand je commençais l'étude de la botanique; M. J. Cardot, qui a bien voulu examiner les Muscinées citées dans ce catalogue; M. C.-H. Delogne, qui, de même, m'a communiqué de nombreuses déterminations et M. J. Hennen, qui m'a procuré de précieux renseignements.

Les ouvrages que j'ai consultés pour dresser ce catalogue, sont principalement les suivants : le *Manuel de la flore de Belgique*, par M. F. Crépin; la *Flore cryptogamique de la Belgique*, par M. C.-H. Delogne; l'*Enumeratio Muscorum Europaeorum*, par M. F. Gravet et la *Flore cryptogamique de l'Est*, par M. l'abbé Boulay.

Anvers, le 6 novembre 1883.

ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES.

C.	Commun	dans les zones campinienne et poldérienne (1).
CC.	Très-commun	dans les zones campinienne et poldérienne (1).
AC.	Assez commun	dans les zones campinienne et poldérienne (1).
R.	Rare	dans les zones campinienne et poldérienne (1).
RR.	Très-rare	dans les zones campinienne et poldérienne (1).
AR.	Assez rare	dans les zones campinienne et poldérienne (1).
Camp.	Zone campinienne.	
Pold.	Zone poldérienne.	
Marit.	Zone maritime.	

(1) Vu le peu d'étendue de la zone maritime, je me borne à y signaler quelques espèces, en m'abstenant de faire mention de cette zone pour les indications générales.

Renonculacées.

Clematis Vitalba L. — Camp. : dans une haieà Anvers. — Probablement introduit.

Thalictrum minus L. — Camp. : sur un mur entre Duffel et Lierre. Quelques pieds. (M. L. Peirsman).

— **flavum** L. — Prairies, bords des eaux. — R. Camp.

Anemone nemorosa L. — Bois, haies, prairies. — C. Camp.

Myosurus minimus L. — Moissons. — AR. Camp.

Ranunculus hederaceus L. — Marais, fossés. — RR. Camp.

— **hololeucos** Lloyd. — Fossés, marais. — R. Camp.

— **divaricatus** Schrk. — Fossés. — AC., AR.

— **aquatilis** L. — Fossés, ruisseaux, rivières. — C.

— **Flammula** L. — Fossés, lieux humides. — AC. Camp.

— **Lingua** L. — Fossés, marais. — R. Camp. Pold. : entre Eeckeren et Wilmarsdonck.

— **auricomus** L. — Prairies, bords des fossés, bois. — AC. Camp., mais manque sur de grands espaces. Pold. : entre Anvers et Hoboken.

— **acris** L. — Prairies, bords des chemins, etc. — C.

— **repens** L. — Prairies, bords des fossés et des chemins. — C.

— **bulbosus** L. — Bords des chemins, pelouses. — AC. Camp. Pold. : çà et là sur des digues où le terrain est mélangé de sable.

— **sardous** Crantz. — Moissons, bords des champs. — AC.

— **arvensis** L. — Moissons. — AC. Camp. R. Pold.

— **sceleratus** L. — Fossés, bords des eaux. — C., AC. Pold., Marit. AR. Camp.

Ficaria ranunculoides Mönch. — Bords des fossés, prairies. — C., AC.

Caltha palustris L. — Fossés, bords des eaux. — C. Camp., Pold., Marit.

Nigella damascena L. — Se rencontre très-rarement échappé des jardins.

Aquilegia vulgaris L. — Camp. : Contich. (1 pied.) — Introduit.

Berbéridées.

Berberis vulgaris L. — Camp. : dans une haie à Duffel. — Introduit.

Caryophyllées.

Silene inflata Sm. — Lieux incultes, prairies. — R. Camp. RR Pold.

— **conica** L. — Camp. : Anvers. (Un seul pied). — Probablement introduit.

Silene gallica L. var. **anglica** Auct. — Champs cultivés, bords des chemins. — R. Camp.

— **noctiflora** L. — Champs cultivés, moissons. — R. Pold.

— **Armeria** L. — Se rencontre très-rarement échappé des jardins.

Melandryum album Gke. — Lieux herbeux et incultes, bords des chemins. — AR., R. et peu abondant dans ses habitations.

— **diurnum** Dmrt. — Bois, haies. — AR. Camp.

Lychnis Flos-Cuculi L. — Prairies, pelouses. — C. ~~Camp.~~ Se rencontre parfois à fleurs blanches.

— **Githago** Lmk. — Moissons. — R.

Spergularia marginata Bor. — Bords des eaux saumâtres, bas-fonds. — AR. Marit.

— **salina** Presl. — Bas-fonds, bords des eaux. — AR. Marit., Pold.

— **rubra** Pers. — Bords des chemins, lieux incultes. — AR. Camp.

Spergula arvensis L. — Champs cultivés, bords des chemins. — C. Camp. RR. Pold. — Cette espèce est très-souvent semée dans Camp.

— **Morisonii** Bor. — Bruyères, lieux arides. — AR. Camp.

Sagina procumbens L. — Champs, lieux herbeux. — AC. Camp.

— **apetala** L. — Moissons, champs cultivés. — AC. Camp.

— **ciliata** Fries. — Moissons, champs cultivés. — R. Camp.

— **nodosa** E. Mey. — Bords des eaux. — R. Camp.

Holosteum umbellatum L. — Moissons. — Camp. : Schooten. Pold.: Merxem (vers sa limite avec Camp.).

Arenaria trinervia L. — Bois, lieux ombragés et herbeux. — AC., AR. Camp.

— **serpyllifolia** L. — Champs cultivés, lieux incultes. — AC.

— — var. **leptoclados**. — Paraît aussi répandu que le type.

Stellaria media Cyr. — Champs cultivés, bords des chemins, etc. — CC.

— — var. **neglecta** (*S. neglecta* Weihe). — Buissons, lieux ombragés. — R. Camp.

— **Holostea** L. — Haies, lisière des bois, buissons. — C. Camp.

— **glauca** With. — Marais, prairies humides. — AR. Camp. Pold. : Merxem.

— **graminea** L. — Buissons, haies. — AC. Camp. R. Pold.

— **uliginosa** Murr. — Fossés, lieux humides. — AC., AR. Camp.

Cerastium triviale Link. — Champs, bords des chemins, etc. — C.

— **glomeratum** Thuill. — Champs, moissons, bords des chemins. — AC., C. Camp. R. Pold.

Cerastium semidecandrum L. — Bords des chemins, lieux incultes. — AC. Camp.

— **arvense** L. — Bords des chemins, coteaux. — AR. Camp.

— **erectum** Coss. et Germ. — Bruyères humides. — Camp. : Gheel.

— **aquaticum** L. — Bords des fossés. — AR.

Élatinées.

Elatine hexandra DC. — Bords des eaux. — Camp. : Herenthals.

Linées.

Linum catharticum L. — Prairies, lieux herbeux. — RR. Camp.

— **usitatissimum** L. — Cultivé en grand.

Radiola linoides Gmel. — Bruyères humides, fossés desséchés. — AR. Camp.

Oxalidées.

Oxalis Acetosella L. — Bois, haies, taillis. — AR. Camp.

— **stricta** L. — Champs cultivés, moissons, jardins. — C. Camp.

— **corniculata** L. — Lieux cultivés, jardins. — Camp. : Anvers. — Naturalisé.

Balsaminées.

Impatiens Noli-tangere L. — Bords ombragés des ruisseaux. — RR. Camp. (M. J.-J. De Beucker a bien voulu m'indiquer l'habitation de cette belle espèce).

Géraniacées.

Geranium phaeum L. — Bords des ruisseaux, bois. — Camp. : Borsbeek (très-abondant), Wilryck. — Je n'en ai trouvé qu'un seul pied dans la seconde localité, mais d'après ce qui m'a été rapporté, cette espèce y existe abondamment dans une habitation.

— **pyrenaicum** L. — Lieux herbeux, bords des chemins. — Camp. : abondant sur les fortifications d'Anvers, mais rare ailleurs.

— **columbinum** L. — Lieux herbeux, bords des chemins. — AR. Pold. RR. Camp.

— **dissectum** L. — Champs cultivés, bords des chemins. — AC.

— **pusillum** L. — Bords des chemins, lieux herbeux, haies. — AR. Camp. R. Pold.

— **molle** L. — Lieux cultivés et incultes, bords des chemins, pelouses. — AC.

— **Robertianum** L. — Bois, lieux ombragés. — AC. Camp.

Erodium cicutarium L'Hérit. — Champs, lieux herbeux. — AR.
— — var. **pimpinellaefolium**. — AC. Camp. AC., AR. Pold.
— **moschatum** L'Hérit. — Décombres. — Camp. : Anvers (abondant), Deurne (rare).

Malvacées.

Malva rotundifolia L. — Bords des chemins, lieux incultes. — AR.
Obs. — J'ai observé le *M. crispa* L., mais peu abondant, à Bornhem dans Camp.
— **sylvestris** L. — Lieux incultes, bords des chemins. — AC.
— **moschata** L. — Prairies, lieux herbeux. — RR. Camp.
Althaea officinalis L. — Digues, lieux herbeux humides. — RR. Pold., Marit.

Tiliacées.

Tilia platyphyllos Scop. — Fréquemment planté.
— **ulmifolia** Scop. — Fréquemment planté.
Obs. — Ces deux espèces étant très-souvent plantées, surtout la seconde, il est difficile à savoir jusqu'à quel point elles pourraient être indigènes.

Polygalées.

Polygala vulgaris L. — Prairies, lieux herbeux. — R. Camp.
— **serpyllacea** Weihe. — Bruyères, bois. — AR. Camp.

Acérinées.

Acer campestre L. — Bois, haies. — AR. Camp.
— **Pseudo-Platanus** L. — Souvent planté dans Camp.

Hippocastanées.

AEsculus Hippocastanum L. — Souvent planté dans Camp.

Ampélidées.

Vitis vinifera L. — Cultivé.
Ampelopsis quinquefolia R. et S. — Cultivé.

Célastrinées.

Evonymus europaea L. — Bois, haies. — AR. Camp.

Hypéricinées.

Hypericum humifusum L. — Lieux sablonneux et bruyères plus ou moins humides, champs. — AC. Camp.

Hypericum perforatum L. — Lisière des bois, haies, bords des chemins, lieux incultes. — AC. Camp. AR. Pold.

Obs. — La variété *lineolatum* est plus répandue que le type.

— **quadrangulum** L. — Bords des fossés, lisière de bois. — AC. Camp.

— **tetrapterum** Fries. — Bords des fossés, lieux humides. — AR.

— **pulchrum** L. — Bois, haies, bruyères. — AR., R. Camp.

Elodes palustris Spach. — Tourbières, mares, fossés. — AR. Camp.

Droséracées.

Drosera rotundifolia L. — Bruyères, bords des marais. — AC., AR. Camp.

— **intermedia** Hayne. — Marais, bruyères humides. — AR. Camp.

— **anglica** Huds. — Observé assez abondamment dans des touffes de Sphaignes, au bord d'une mare à Oolen dans Camp., où il a été découvert par M. J. Hennen et par moi.

Pyrolacées.

Pyrola minor L. — Bois. — R. Camp.

Résédacées.

Reseda lutea L. — Lieux herbeux et incultes, bords des chemins. — Camp. : assez abondant sur les fortifications d'Anvers et çà et là dans les environs de cette ville, mais souvent par pieds isolés. — Paraît introduit.

— **odorata** L. — Cultivé.

Nymphéacées.

Nymphaea alba L. — Étangs, fossés. — AC. Camp. Pold. : Eeckeren et Wilmarsdonck.

Nuphar luteum Sibth. et Sm. — Étangs, fossés, rivières. — AC. Camp. Pold : entre Eeckeren et Wilmarsdonck, Wilmarsdonck et Oorderen.

Papavéracées.

Papaver Rhoeas L. — Moissons, champs cultivés. — C. Camp. AC. Pold.

— **dubium** L. — Moissons, champs cultivés et incultes. — AR. Camp. RR. Pold.

Papaver Argemone L. — Moissons, champs cultivés. — AR. Camp. RR. Pold.

Chelidonium majus L. — Haies. — AC., AR. Camp.

Fumariacées.

Corydalis solida Sm. — Bords des ruisseaux, prairies. — Camp. : environs d'Aertselaer (très-abondant).

— **claviculata** DC. — Taillis. — RR. Camp.

— **lutea** DC. — Vieux murs. — Camp. : Malines.

Fumaria officinalis L. — Champs cultivés, haies. — AC. Camp. AR. Pold.

— — var. **media** (*F. media* Lois.). — R. Camp.

— **densiflora** DC. — Marit. : Anvers (un seul pied).

Crucifères.

Barbarea vulgaris R. Br. — Bords des chemins et des eaux, champs cultivés — R. et peu abondant dans ses habitations. Camp. RR. Pold.

— **intermedia** Bor. — Champs, bords des chemins. — R.

Cardamine pratensis L. — Prairies, bords des fossés, bois. — C.

Obs. — J'ai rencontré cette espèce à *fleurs doubles* dans Pold. entre Eeckeren et Wilmarsdonck. Elle y est abondante.

— **amara** L. — Bords des eaux, bois. — R. Camp.

— **hirsuta** L. — Champs cultivés, bords des chemins. — AC. Camp. AR. Pold.

Obs. — J'ai trouvé un pied de cette espèce à *fleurs doubles* à Wilryck dans Camp.

— **sylvatica** Link. — Bois, champs, bords des chemins. — AR. Camp.

Nasturtium officinale R. Br. — Fossés, ruisseaux. — AC.

— **amphibium** R. Br. — Fossés, bords des eaux. — AC.

— **palustre** DC. — Bords des eaux, lieux humides. — R.

— **sylvestre** R. Br. — Lieux incultes, bords des chemins. — AC.

Sisymbrium Alliaria Scop. — Bois, bords des fossés. — AR. Camp.

— **Thalianum** J. Gay. — Champs cultivés, bords des chemins. — AC. Camp.

— **officinale** Scop. — Lieux incultes, décombres, bords des chemins. — AC.

— **Sophia** L. — Lieux sablonneux incultes. — Camp. : Anvers (1 pied).

Sisymbrium Sinapistrum Crantz. — Lieux incultes. — Camp. : Anvers (abondant), Wyneghem (1 pied).

Erysimum cheiranthoides L. — Champs cultivés. — AR. Pold. R. Camp.

Diplotaxis tenuifolia DC. — Lieux incultes, bords des chemins. — AR., mais très-abondant dans ses habitations.

Eruca sativa Lmk. — Lieux incultes. — RR. Camp. — Introduit.

Brassica nigra Koch. — Digues aux bords de l'Escaut. — Pold. : entre la Tête-de-Flandre et Burght.

— **oleracea** L. — Cultivé.

— **Napus** L. — Cultivé.

— **Rapa** L. — Cultivé.

Sinapis arvensis L. — Champs cultivés, bords des chemins. — AC., C.

— **alba** L. — Lieux incultes, bords des chemins. — RR. Camp. — Introduit.

— **Cheiranthus** Koch. — Bords des champs. – Camp. : Malines. Abondant (M. le curé J. Blox).

Raphanus Raphanistrum L. — Champs cultivés, moissons. — AC.

— **sativus** L. — Cultivé.

Alyssum incanum L. — Lieux incultes, bords des chemins. — Camp. : abondant dans les environs immédiats d'Anvers, mais ailleurs, je ne l'ai observé qu'à Wavre-Ste-Catherine. Pold. : Merxem.

Draba verna L. — Moissons, champs. — CC. Camp. AR. Pold.

Cochlearia danica L. — Lieux sablonneux. — Un seul pied en a été trouvé à Anvers dans Marit. par M. J. Hennen.

— **Armoracia** L. — Camp. : peu abondant sur les fortifications d'Anvers.

Camelina sativa Crantz. — Rarement cultivé. Se rencontre çà et là dans les champs et aux bords des chemins. — Pas indigène.

— **dentata** Pers. — Champs de lin. — Camp. : Reeth. — Naturalisé.

Teesdalia nudicaulis R. Br. — Champs cultivés, moissons, bords des chemins. — AC., AR. Camp.

Thlaspi arvense L. — Champs cultivés, moissons. — AR.

Iberis amara L. — Champs cultivés. — Camp. : Willebroeck (quelques pieds).

Capsella Bursa-pastoris Mönch. — Champs cultivés et incultes, bords des chemins. – C.

Lepidium campestre R. Br. — Champs cultivés, lieux incultes. —

Camp. : fortifications d'Anvers. Pold. : Merxem (vers sa limite avec Camp).

Lepidium ruderale L. — Lieux incultes, bords des chemins. — Pold : sur la digue de l'Escaut aux environs de Lillo (2 pieds). Camp. : Anvers (peu abondant).

Senebiera Coronopus Poir. — Bords des chemins, champs, lieux herbeux. — C. Pold.

Bunias orientalis L. — Lieux incultes, bords des chemins. — RR. Camp. — Introduit.

Violariées.

Viola odorata L. — Haies, taillis, bords des chemins. — AR. Camp.

— **palustris** L. — Prairies et bois marécageux, bruyères humides. — R. Camp.

— **sylvestris** Lmk. — Haies, taillis. — La var. *Riviniana* (*V. Riviniana* Rchb.) est AC. dans Camp. et la var. *Reichenbachiana* (*V. Reichenbachiana* Jord.) y est AR.

— **canina** L. — Bois, bords des chemins, bruyères — AR. Camp.

— **tricolor** L. — Champs cultivés. — La var. à grandes fleurs est AC. dans Camp. et celle à fleurs petites (*V. arvensis* Murr.) est AC. dans Camp. et AR. dans Pold.

Rhamnées.

Rhamnus Cathartica L. — Prairies humides et bords des eaux, haies. — Camp. : Schilde (M. J. Berckmans). — Cultivé à Capellen dans Camp. (M. Hennen).

— **Frangula** L. — Bois, taillis, haies — AC. Camp.

Papilionacées.

Sarothamnus scoparius Koch. — Bruyères, bois, lieux sablonneux incultes. — AC. Camp.

Cytisus Laburnum L. — Fréquemment planté.

Genista anglica L. — Bruyères. — AC., AR. Camp.

— **tinctoria** L. — Prairies. — Camp. : Gheel (abondant).

— **pilosa** L. — Bruyères, lieux sablonneux incultes. — AR. Camp.

Lupinus luteus L. — Cultivé en grand.

— **polyphyllus** R. Br. — Naturalisé sur la ligne du chemin de fer entre Vieux-Dieu et Contich (très-abondant).

Ulex europaeus L. — Lieux arides, bords des chemins. — AC., AR. Camp. — Introduit.

Ononis spinosa L. — Bords des chemins, digues. — AC. Pold. RR. Camp.

— **repens** L. — Pelouses, bords des chemins. — Camp. : Wyneghem (abondant).

Anthyllis Vulneraria L. — Pelouses, bords des chemins. — Camp. : abondant sur les fortifications d'Anvers, d'où il se répand parfois dans les environs.— Introduit.

Lotus uliginosus Schk. — Bords des eaux, prairies humides. — AC. Camp. AR. Pold.

— **corniculatus** L. — Pelouses, prairies, bords des chemins. — C. Camp. AC. Pold.

Robinia Pseudo-Acacia L. — Souvent planté.

Colutea arborescens L. — Cultivé.

Astragalus glycyphyllos L. — Taillis, bois, décombres. — Camp. : Deurne. — Si cette espèce n'y est pas indigène, du moins elle y existe depuis de longues années. — J'ai observé cette espèce à Tongerloo dans Camp., où elle a été découverte par M. J. Hennen.

Melilotus altissimus Thuill. — Bords des eaux. — R. Marit. RR. Camp.

— **officinalis** Desr. non Willd. — Lieux incultes, bords des chemins, décombres. — R. Camp. — Se rencontre souvent par pieds isolés.

— **albus** Desr. — Lieux incultes, pelouses, taillis. — RR. Camp. — Naturalisé.

— **parviflorus** Desf. — Décombres, bords des chemins. — Se rencontre çà et là à l'état d'introduction.

Medicago Lupulina L. — Prairies, pelouses, bords des chemins. — C.

— **falcata** L. — Lieux incultes, bords des chemins. — RR. Camp.

— **sativa** L. — Se rencontre çà et là à l'état d'introduction.

— **apiculata** Willd. var. **denticulata**. — Décombres, bords des chemins. — RR. Camp. — Introduit.

— **maculata** Willd. — Pelouses, lieux herbeux, bords des chemins, décombres. — AC., AR.

Trifolium minus Relhan. — Pelouses, bords des chemins. — C.

— **procumbens** L. — Champs cultivés, moissons. — Camp. : AC. au sud de la ville d'Anvers, mais je ne l'ai pas observé ailleurs. Pold.: entre Eeckeren et Wilmarsdonck (M. J. Hennen).

— **pratense** L. — Prairies, bords des chemins. — C. — Cette espèce

est très-souvent cultivée en grand et se rencontre quelquefois à fleurs d'un blanc-rosé.

Trifolium incarnatum L. — Souvent cultivé dans Camp.

— **arvense** L. — Lieux sablonneux, bords des chemins. — AR. Camp.

— **repens** L. — Prairies, pelouses, bords des chemins, etc. — CC.

— **elegans** Sav. — Champs, prairies, lieux incultes. — AR. Camp. R. Marit. RR. Pold. — Introduit et naturalisé.

— **fragiferum** L. — Bords des chemins, lieux herbeux. — C. Pold.

Phaseolus vulgaris L. — Cultivé.

Vicia angustifolia All. — Moissons, champs cultivés. — AC.

— **lathyroides** L. — Champs sablonnneux, bords des chemins. — RR. Camp.

— **sepium** L. — Buissons, haies, bords des chemins. — AC. Camp. AR. Pold.

— **Cracca** L. — Haies, moissons, lieux incultes. — AC.

— **villosa** Roth. — Pelouses, champs, lieux incultes. — Camp. : Wyneghem, Anvers. Pold. : entre Anvers et Hoboken.

— **tetrasperma** Mönch. — Moissons, champs cultivés, haies. — AR. Pold. R. Camp.

— **hirsuta** Koch. — Moissons, champs cultivés. — C. Camp. AC. Pold.

Faba vulgaris Mönch. — Cultivé.

Pisum sativum L. — Cultivé.

— **arvense** L. — Très-rarement cultivé.

Lathyrus pratensis L. — Haies, prairies, champs. — AC. Camp. AR. Pold.

— **tuberosus** L. — Bords des chemins, champs cultivés. — Pold. : Merxem (abondant).

— **sylvestris** L. — Buissons, bords des chemins. — Camp. : Malines (abondant).

— **Aphaca** L. — Moissons, lieux incultes. — Camp. : Wyneghem, Anvers.

Orobus tuberosus L. — Bois. — Camp. : Brasschaet (peu abondant).

Ornithopus perpusillus L. — Lieux sablonneux incultes, lieux herbeux. — AC. Camp.

— **sativus** Brot. — Cultivé en grand ou introduit.

— **compressus** L. — Bords des chemins, lieux arides. — Camp. : Oeleghem. — Cette plante méridionale que j'ai découverte l'année dernière avec M. J. Hennen, à Oeleghem, s'y est encore maintenue cette année.

Lythrariées.

Lythrum Salicaria L. — Bords des eaux. — AC. Camp. Existe dans Marit., mais paraît manquer dans Pold.

Peplis Portula L. — Fossés, mares. — AR. Camp.

Portulacées.

Montia fontana L. — Moissons, champs cultivés humides. — AC. Camp.

Claytonia perfoliata Donn. — Se rencontre quelquefois dans Camp. le long des haies, échappé des jardins.

Portulaca oleracea L. — Cultivé.

Paronychiées.

Corrigiola litoralis L. — Champs et chemins sablonneux. — R., RR. Camp.

Herniaria hirsuta L. — Champs cultivés. — Camp. : entre Malines et Bonheyden (un seul pied).

Illecebrum verticillatum L. — Champs frais, fossés desséchés, bords des chemins. — AR. Camp.

Scleranthus annuus L. — Moissons, champs cultivés. — C. Camp. RR. Pold.

— **perennis** L. — Bruyères, lieux incultes. — RR. Camp.

Crassulacées.

Sedum acre L. — Digues, murs, lieux incultes. — R.

— **reflexum** L. — M. J. Hennen a observé cette espèce abondamment au bord d'un fossé à Brasschaet dans Camp.

— **purpureum** Link. — Taillis, bois, bords des fossés. — AC. Camp.

Sempervivum tectorum L. — Cultivé.

Cerasus avium Mönch. — Bois, haies. — AR. Camp.

— **vulgaris** Mill. — Cultivé.

— **Padus** DC. — Bois, haies. — AR., R. Camp. — Me paraît bien indigène.

Prunus spinosa L. — Haies, bois, bords des chemins. — AR. Camp.

— **insititia** L. — Cultivé.

— **domestica** L. — Id.

— **Armeniaca** L. — Id.

Amygdalus Persica L. — Cultivé.

Rosacées.

Spiraea Ulmaria L. — Bords des eaux. — AC. Camp. AR. Pold.
— — var. **denudata** Presl. — R. Camp.
Rubus Idaeus L. — Bois. — AR., R. Camp.
— **caesius** L. — Bois, buissons. — R.
— **Sprengelii** W. et N. — Bords des chemins, bois.
— **Schleicheri** W. et N. — Bois, bords des chemins.
— **villicaulis** Köhler. — Haies, bois, bords des chemins.
— **discolor** W. et N. — Bois, haies. — R. Camp.
— **hybridus** Vill. — Bois, haies. — R. Camp.
Obs. — La dispersion des *R. Sprengelii*, *Schleicheri* et *villicaulis* m'est imparfaitement connue.
Geum urbanum L. — Bois, haies, taillis. — AC. Camp.
Fragaria vesca L. — Bois, haies, lieux herbeux. — AC. Camp. AR. Pold.
Comarum palustre L. — Marais, fossés, prairies marécageuses. — AC., AR. Camp.
Potentilla sterilis Gke. — Bois, haies. — AR. Camp.
— **sylvestris** Neck. — Bois, bruyères, haies. — AC. Camp.
— **procumbens** Sibth. — Bords des fossés, lieux humides. — AR. Camp.
— **reptans** L. — Lieux herbeux, bords des chemins. — AC. Camp. R. Pold.
— **Anserina** L. — Bords des chemins et des fossés. — C.
— **argentea** L. — Lieux herbeux, bords des chemins. — RR. Camp. Pold. : entre Eeckeren et Wilmarsdonck.
— **recta** L. — Lieux incultes, prairies. — Camp. : abondant à Merxem. — Introduit.
Rosa rubiginosa L. — Digues, bords des chemins. — Pold. : Wilmarsdonck (très-abondant).
— **canina** L. — Lisière des bois, bords des chemins. — AR.
Agrimonia Eupatoria L. — Bords des chemins, lieux herbeux, bois. — AC. Pold. R., RR. Camp.

Sanguisorbées.

Alchemilla arvensis Scop. — Champs cultivés, moissons. — C. Camp.
— **vulgaris** L. — Prairies fraîches. — RR. Camp.
Poterium Sanguisorba L. — Lieux herbeux. — Camp. : abondant sur les fortifications d'Anvers, mais évidemment introduit.

Pomacées.

Mespilus germanica L. — Bois, haies. — RR. Camp. et souvent par pieds isolés.

Crataegus monogyna Jacq. — Haies, bois. — C., mais très-souvent planté.

— **Oxyacantha** L. — Se rencontre çà et là planté dans les haies parmi le *C. monogyna*.

Cydonia vulgaris Pers. — Cultivé.

Pyrus communis L. — Id.

Malus communis Poir. — Id.

Sorbus aucuparia L. — Bois, taillis. — AC , AR Camp.

Onagrariées.

Epilobium spicatum Lmk. — Bois, bords des chemins, lieux incultes. — AR. Camp.

— **hirsutum** L. — Bords des eaux. — R. Camp. RR. Pold. Marit. : entre Anvers et Hoboken.

— **parviflorum** Retz. — Bords des eaux. — AC.

— **montanum** L. — Bois. — AR. Camp.

— **roseum** Retz. — Bords des eaux, bois. — AR. Camp.

— **tetragonum** L. — Bords des eaux. — R. Camp.

— **obscurum** Rchb. — Bords des eaux, lieux humides. — R. Camp.

— **palustre** L. — Marais, bords des eaux. — AR. Camp.

OEnothera biennis L. — Lieux incultes et herbeux, bois. — AR., R. Camp. — Naturalisé.

— **muricata** L — Cette espèce est abondante dans une habitation sur les fortifications d'Anvers dans Camp. — Introduit.

Isnardia palustris L. — Marais, fossés. — Camp. : abondant aux environs de Gheel et d'Oolen.

Circéacées.

Circaea lutetiana L. — Bois. — AR., R. Camp.

Halorayées.

Myriophyllum spicatum L. — Fossés, canaux, rivières. — AC.

— **alterniflorum** DC. — Fossés. — RR. Camp. Marit. : Tête-de-Flandre.

Ombellifères.

Hydrocotyle vulgaris L. — Bords des fossés, endroits humides. — AC., AR. Camp. R. Pold.

Astrantia major L. — Cultivé comme plante d'ornement.

Sanicula europaea L. — Bois. — R. Camp.

Cicuta virosa L. — Bords des canaux et des rivières, marais. — AR. Camp.

AEgopodium Podagraria L. — Bords des fossés, bois, bords des chemins, pelouses. — AC. Camp. RR. Pold.

Petroselinum sativum Hoffm. — Cultivé.

Apium graveolens L. — Bords des eaux, lieux incultes, bords des chemins. — AC. Pold., Marit.

Helosciadium nodiflorum Koch. — Fossés, ruisseaux, étangs. — AC.

— **inundatum** Koch. — Fossés, ruisseaux. — R. Camp.

Sium latifolium L. — Bords des eaux. — AR. Camp. R. Pold.

— **angustifolium** L. — Bords des eaux, fossés. — AC., AR. Camp. AR. Pold., Marit.

Pimpinella magna L. — Alluvions des rivières, bords des chemins. — AR. Camp. La var. *dissecta* (*P. dissecta* Retz.) à segments des feuilles pinnatifides est RR. dans Camp.

— **saxifraga** L. — Bords des chemins, lieux herbeux et incultes. — AC., AR. Camp.

AEthusa Cynapium L. — Jardins, lieux cultivés. — AC.

OEnanthe Phellandrium Lmk. — Fossés, marais, étangs. — AC.

— **fistulosa** L. — Fossés, ruisseaux. — AC. Pold. AR. Camp.

— **Lachenalii** Gmel. — Bords de l'Escaut. — AR. Marit.

Foeniculum capillaceum Gilib. — Cultivé.

Selinum carvifolia L. — Bois humides — Camp. : Brasschaet (peu abondant).

Angelica sylvestris L. — Prairies, bords des fossés. — AC., AR.

Peucedanum palustre Mönch. — Bords des eaux, marais. — AC. Camp.

Pastinaca sativa L. — Bords des fossés, prairies. — RR.

Heracleum Sphondylium L. — Prairies, haies. — AC.

Daucus Carota L. — Lieux herbeux, bords des chemins. — C.

Torilis Anthriscus Gmel. — Lieux incultes, bords des chemins, bois. — AC.

— **nodosa** Gärtn. — Lieux herbeux, digues. — AR. Pold.

Anthriscus Cerefolium Hoffm. — Cultivé.

— **sylvestris** Hoffm. — Bords des fossés, prairies, bords des chemins. — C., AC. Camp. AR. Pold.

Chaerophyllum temulum L. — Bois, haies, buissons. — AC., AR. Camp. R. Pold.

Myrrhis odorata Scop. — Cultivé.

Scandix Pecten-Veneris L. — Moissons, champs cultivés. — R. Pold. RR. Camp.

Conium maculatum L. — Décombres, lieux incultes et herbeux. — R. Pold. RR. Camp.

Hédéracées.

Hedera Helix L. — Bois. — AC. Camp.

Cornus sanguinea L. — Haies, bois. — AC., AR. Camp.

— **mas** L. — Haies. — Camp. : Reeth, mais planté.

Grossulariées.

Ribes rubrum L. — Bois humides. — RR. Camp.

— **nigrum** L. — Bois humides, haies. — R. Camp.

Saxifragées.

Saxifraga tridactylites L. — Lieux arides, bords des chemins. — Camp. : Schooten (peu abondant).

— **granulata** L. — Prairies. — AC. Camp.

Chrysosplenium alternifolium L. — Bords des ruisseaux ombragés, taillis, lieux humides. — R., RR. Camp.

Éricinées.

Andromeda polifolia L. — Mares, bruyères humides. — RR. Camp.

Erica Tetralix L. — Lieux arides, bords des chemins. — AC. Camp.

Calluna vulgaris Salisb. — Lieux arides, bords des chemins. — C., CC. Camp.

Primulacées.

Primula officinalis Jacq. — Camp. : introduit sur les fortifications d'Anvers (très-abondant).

— **elatior** Jacq. — Bois, haies et taillis humides, bords des fossés et des ruisseaux. — AC. Camp.

Hottonia palustris L. — Fossés, mares, étangs. — AC.

Glaux maritima L. — Bas-fonds, lieux herbeux, bords de l'Escaut, bords des chemins. — AR., AC. Pold., Marit.

Lysimachia nemorum L. — Bois frais. — Observé par M. J. Hennen entre Wilryck et Aertselaer dans Camp.

— **Nummularia** L. — Bords des eaux. — C., AC.

— **vulgaris** L. — Bords des eaux, bois. — AC. Camp.

— **thyrsiflora** L. — Bords des eaux. — R. Camp.

Samolus Valerandi L. — Bords des fossés et des étangs, marais. — AC., AR. Pold. RR. Camp.

Anagallis arvensis L. — Champs cultivés. — AC.

— — var. **caerulea**. — RR. Camp.

— **tenella** L. — Bruyères humides et tourbeuses. — RR Camp.

Plombaginées.

Armeria maritima Willd. — Bords des eaux saumâtres, bas-fonds. — AR. Marit.

Statice Limonium L. — Bords des eaux saumâtres. — Marit. : autrefois observé aux bords de l'Escaut entre Lillo et Santvliet, où je ne l'ai plus revu.

Plantaginées.

Litorella lacustris L. — Mares. — RR. Camp.

Plantago major L. — Prairies, pelouses, bords des chemins. — C.

— **media** L. — Pelouses, lieux herbeux. — Camp. : fortifications d'Anvers et pelouses à Anvers (abondant). — Introduit.

— **lanceolata** L. — Prairies, pelouses, bords des chemins. — C.

— **maritima** L. — Bas-fonds, prairies, bords des eaux saumâtres. — AC. Marit.

— **Coronopus** L. — Bords des chemins, pelouses. — AC. Camp. R. Pold., Marit.

Plantago arenaria W. et K. — Lieux sablonneux, bords des chemins. — RR. Camp — Introduit.

Ilicinées.

Ilex Aquifolium L. — Bois. — RR. Camp.

Oléinées.

Ligustrum vulgare L. — Se rencontre çà et là planté.
Fraxinus excelsior L. — Bords des eaux, bois humides. — Souvent planté et ayant parfois l'aspect indigène.
Syringa vulgaris L. — Cultivé.

Apocynées.

Vinca minor L. — Bois, lieux ombragés. — R. Camp.
— **major** L. — Cultivé comme plante d'ornement.

Gentianées.

Menyanthes trifoliata L. — Marais, fossés, prairies marécageuses. — AC., AR. Camp.
Limnanthemum nymphoides Link. — Canaux. — RR. Camp.
Gentiana Pneumonanthe L. — Bruyères humides, bords des fossés. — AR. Camp.
Cicendia filiformis Delarbre. — Bruyères et prairies humides. — RR. Camp.
Erythraea Centaurium Pers. — Bruyères humides, bords des fossés, lieux incultes. — AC., AR. Camp.
— **pulchella** Fries. — Pâturages humides, bords des chemins. — R. Marit. RR. Pold.

Convolvulacées.

Convolvulus sepium L. — Haies, taillis, buissons. — AC.
— **arvensis** L. — Champs cultivés, moissons, pelouses. — AC.

Cuscutacées.

Cuscuta Epilinum Weihe. — Champs de lin. — Camp. ; Reeth. — Introduit.
— **Epithymum** Murr. — Bruyères. — R., AR. Camp.

Borraginées.

Borrago officinalis L. — Cultivé.

Lycopsis arvensis L. — Champs cultivés et incultes, moissons. — AR. Camp.

Symphytum officinale L. — Bords des eaux, prairies, haies. — AC.

Myosotis palustris With. — Fossés, prairies humides. — C. Pold., Marit. AC. Camp.

— **caespitosa** C.-F. Schultz. — Fossés. — RR.

— **intermedia** Link. — Champs, bois. — AC.

— — var. **dumetorum** Crép. — Bois. — Camp. : abondant entre Edeghem et Contich.

— **arenaria** Schrad. — Lieux cultivés et incultes, bords des chemins. — RR. Camp.

— **hispida** Schlecht. — Coteaux, lieux herbeux. — R.

— **versicolor** Sm. — Champs cultivés, moissons. — C. Camp., mais paraît R. dans Pold.

Lithospermum arvense L. — Champs cultivés, bords des chemins, moissons. — AR. Camp. R. Pold.

Pulmonaria officinalis L. — Pelouses ombragées. — Camp. : Deurne (abondant).

Echium vulgare L. — Lieux incultes, décombres. — R. et peu abondant dans ses habitations. Camp.

Echinospermum Lappula Lehm. — Lieux incultes, bords des chemins. — Très-rarement introduit.

Solanées.

Solanum Dulcamara L. — Bords des fossés, buissons. — AR. Camp. RR. Marit.

— **nigrum** L. — Champs cultivés. — AC.

— **tuberosum** L. — Cultivé.

Nicandra physaloides Gärtn. — Champs cultivés, jardins, lieux incultes. — RR. Camp. — Introduit et se rencontre souvent par pieds isolés.

Datura Stramonium L. — Décombres, lieux incultes. — RR. Camp. — Naturalisé.

Hyoscyamus niger L. — Lieux incultes, décombres. — RR. Camp.

Verbascées.

Verbascum Thapsus L. — Décombres, bords des chemins, pelouses, puits. — R. Camp. RR. Pold.

— **nigrum** L. — Lieux sablonneux incultes. — Camp. : Deurne (3 pieds).

— **Blattaria** L. — Pelouses. — Camp. : fortifications d'Anvers. — Introduit.

Scrophularinées.

Veronica hederaefolia L. — Champs cultivés, moissons. — C.

— **agrestis** L. — Champs cultivés. — AC. Pold. AR. Camp

— **polita** Fries. — Champs cultivés. — AC. Pold.

— **persica** Poir. — Champs cultivés, lieux incultes. — AR. Pold. RR. Camp., Marit — Naturalisé. — Cette espèce est très-répandue dans Pold.

— **triphyllos** L. — Moissons. — AC., AR. Camp. Pold. : Merxem (vers sa limite avec Camp.).

— **arvensis** L. — Champs cultivés, lieux incultes. — AC.

— **serpyllifolia** L. — Lieux herbeux, champs cultivés, bords des chemins. — AC. Camp. R. Pold.

— **longifolia** L. — Buissons, prairies humides, haies. — Camp. : abondant entre Lierre et Emblehem.

— **officinalis** L. — Lieux incultes, pelouses, bords des chemins. — AR. Camp.

— **scutellata** L. — Bords des eaux. — AR. Camp.

— **Anagallis** L. — Fossés, ruisseaux. — AC. Camp., Pold. AR. Marit.

— **Beccabunga** L. — Fossés, ruisseaux. — AR. Camp., Pold., Marit.

— **Chamaedrys** L. — Haies, buissons, lieux herbeux. — C.

Scrophularia nodosa L. — Bois, bords des fossés, haies. — AC. Camp.

— **aquatica** L. — Bords des eaux. — AR.

— **umbrosa** Dmrt. — Bords des ruisseaux et des rivières. — RR. Camp.

Digitalis purpurea L. — Bois, bords des fossés. — Camp. : abondant dans deux habitations à Cappellen (M. J. Hennen), Reeth. (1 pied).

Antirrhinum Orontium L. — Champs cultivés. — AR., R. Camp.

Linaria minor Desf. — Champs cultivés. — R. Pold. RR. Camp.

— **Elatine** Mill. — Lieux cultivés, moissons. — AR., R.

— **Cymbalaria** Mill. — Vieux murs. — RR. Camp. — Naturalisé.

— **vulgaris** Mill. — Bords des chemins, lieux incultes. — AC., AR.

Pedicularis sylvatica L. — Bruyères, bois, prairies. — AR. Camp.

— **palustris** L. — Prairies marécageuses, tourbières. — AR. Camp.

Rhinanthus minor Ehrh. — Prairies. — AR.

— **major** Ehrh. — Prairies. — AC., AR.

Melampyrum pratense L. — Bois, taillis — AC. Camp.

Euphrasia officinalis L. — Prairies, bruyères. — AC. Camp.

— — var **nemorosa**. — Plus répandu que le type.

— **Odontites** L. — Bords des chemins, lieux incultes. — AC.

Lentibulariées.

Utricularia vulgaris L. — Fossés, mares, étangs. — R. Camp. Pold. : entre Eeckeren et Wilmarsdonck.

— — var. **neglecta** (*U. neglecta* Lehm.) Se rencontre çà et là dans Camp.

— **intermedia** Hayne. — Marais, fossés. — Camp. : abondant à Gheel (M. J. Hennen et moi).

— **minor** L. — Fossés, mares. — R., mais abondant dans ses habitations. Camp.

Orobanchées.

Orobanche Rapum Thuill. — Lieux incultes, bords des chemins. — R. Camp.

— **minor** Sutt. — Champs de trèfle. — AC. Pold. AR. Camp.

— — var. **flavescens** Reut. — Pold. : Oorderen et Wilmarsdonck (abondant).

Labiées.

Mentha rotundifolia L. — Bords des chemins, lieux incultes. — RR. et paraissant introduit dans Camp. Pold. : Santvliet (M. J. Hennen).

— **aquatica** L. — Bords des eaux. — C.

Obs. — Le *M. sativa* L. est R. dans Camp.

— **arvensis** L. — Champs cultivés, lieux humides. — AC. Camp. AR. Pold.

Lycopus europaeus L. — Lisière des bois, bords des fossés. — AC. Camp. AR Pold.

Salvia officinalis L. — Cultivé.

— **verticillata** L. — Lieux incultes. — Camp. : Anvers (un seul pied), Wyneghem (assez abondant). — Introduit.

— **Sclarea** L. — Lieux incultes. — J'en ai trouvé un pied à Wyneghem dans Camp. à l'état d'introduction.

Origanum vulgare L. — Lieux incultes. — Camp. : abondant dans une habitation à Mortsel.

Thymus Serpyllum L. — Champs sablonneux incultes, bruyères, dunes. — AR. Camp.

Calamintha Acinos Clairv. — Lieux herbeux. — Camp. : existe, mais en petite quantité, sur les fortifications d'Anvers et peut-être à l'état d'introduction.

Clinopodium vulgare L. — Pelouses, bords des chemins. — Camp. : Wyneghem (abondant).

Satureia hortensis L. — Cultivé.

Nepeta Cataria L. — Décombres. — Pold. : un seul pied à Merxem (M. J. Hennen). — Introduit.

Glechoma hederacea L. — Bords des fossés, bois, haies. — C.

Lamium amplexicaule L. — Champs cultivés. — AC., AR.

— **incisum** Willd. — Lieux cultivés. — Pold. : Austruweel

— **purpureum** L. — Champs, moissons, jardins, haies. — C.

— — var. **decipiens** Sand. — R.

— — var. **incanum** Bell. — RR. Camp.

— **album** L. — Haies, bords des chemins. — AC.

Galeobdolon luteum Huds. — Bois, haies. — AC. Camp , mais manque sur de grands espaces. Je n'ai observé cette espèce que dans un cercle d'environ trois lieues, dont Anvers est le centre.

Galeopsis Ladanum L. — Lieux incultes. — Camp. : Anvers (peu abondant et probablement introduit).

— **villosa** Huds. — Moissons, champs sablonneux. — AR. Camp.

— **Tetrahit** L. — Bois, champs cultivés, lieux incultes, haies. — AC. Camp. AR. Pold.

— **versicolor** Curt. — Moissons, lieux incultes. — RR. Camp

Stachys sylvatica L. — Bois, haies, buissons. — AR. Camp. R. Pold.

— **palustris** L. — Bords des fossés, champs humides. — AC.

— **arvensis** L. — Champs cultivés. — AC., AR.

— **annua** L. — Lieux incultes. — Camp. : Merxem (2 pieds). — Introduit.

Marrubium vulgare L. — Décombres, voisinage des habitations. — Camp. : Deurne (très-rare).

Ballota nigra L. — Décombres, lieux incultes, voisinage des habitations. — AR.

Brunella vulgaris L. — Bords des chemins, lieux herbeux, buissons. — C.

— — var. **surrecta** Dmrt. — AC.

Scutellaria galericulata L. — Bords des eaux. — AC. Camp. AR. Pold

— **minor** L. — Bords des fossés, lieux humides, bois. — AR. Camp.

Ajuga reptans L. — Prairies, bois, haies. — AC. Camp.

Teucrium Scorodonia L. — Lisière des bois, haies, lieux herbeux. — AC. Camp.

Verbénacées.

Verbena officinalis L. — Digues, endroits herbeux, bords des chemins. — AC., AR. Pold. R., RR. Camp.

Vacciniées.

Vaccinium Myrtillus L. — Bois. — C. Camp.

— **Vitis-idaea** L. — Bois. — Camp. : Gierle et Vosselaer (très-abondant).

Oxycoccos palustris Pers. — Bruyères et prairies humides, tourbières. — Camp. : Oolen, Gheel.

Campanulacées.

Campanula rotundifolia L. — Coteaux, bords des chemins, endroits herbeux. — AC. Camp.

— **rapunculoides** L. — Pelouses, bords des chemins. — RR. Pold.

— **Trachelium** L. — Bois, taillis, haies. — AR. Camp.

— **Rapunculus** L. — Haies, bords des chemins, lieux herbeux. — C. Camp. AR. Pold.

Specularia Speculum Alph. DC. — Moissons, bords des chemins. — RR.

— **hybrida** Alph. DC. — Moissons, lieux cultivés. — Pold. (vers sa limite avec Camp.) : Merxem (abondant).

Phyteuma spicatum L. — Bois. — Camp. : Schooten

— — var. **nigrum**. — RR. Camp. — Cette variété est moins rare que le type.

Jasione montana L. — Bords des chemins, lieux sablonneux. — AC. Camp.

Wahlenbergia hederacea Rchb. — Bords des eaux, bruyères humides, bois. — RR., mais abondant dans ses habitations. Camp.

Lobéliacées.

Lobelia Dortmanna L. — Étangs, mares. — RR., mais abondant dans ses habitations. Camp.

Cucurbitacées.

Bryonia dioica Jacq. — Haies. — Camp. : Anvers.

Caprifoliacées.

Adoxa Moschatellina L. — Buissons, haies. — AC. Camp., mais fait défaut dans bien des localités. — Cette espèce existe à peu près dans le même rayon, aux environs d'Anvers, que le *Galeobdolon luteum* Huds.

Sambucus Ebulus L. — Prairies, digues. — Pold. : très-abondant entre Anvers et Hoboken, où l'espèce existe depuis de longues années.

— **nigra** L. — Cette espèce étant souvent plantée, il est difficile de dire jusqu'à quel point elle est indigène.

Viburnum Opulus L. — Bois, taillis, haies. — AC. Camp.

— **Lantana** L. — Cultivé.

Lonicera Periclymenum L. — Buissons, bois, haies. — AR. Camp.

Symphoricarpus racemosus Michaux. — Cultivé.

Rubiacées.

Sherardia arvensis L. — Champs cultivés, moissons. — AC. Pold. R. Camp.

Galium Cruciata Scop. — Bois, buissons, prairies. — R. Camp. Pold. : Oorderen (abondant).

— **verum** L. — Buissons, bords des chemins. — RR. Camp.

— **Mollugo** L. — Haies, buissons, prairies. — AC. Camp. R. Pold.

— **saxatile** L — Prairies. — RR. Camp.

— **palustre** L. — Fossés, lieux humides. — C.

— — var. **elongatum** — Moins répandu que le type.

— **uliginosum** L. — Buissons, bruyères humides. — RR. Camp.

— **Aparine** L. — Haies, buissons, champs. — C.

— **tricorne** With. — Champs cultivés, moissons. — R. Pold.

Valérianées.

Valeriana officinalis L. — Bords des fossés, haies, buissons. — AC. Camp. AR. Pold.

— **dioica** L. — Bords des eaux, prairies humides. — AC., AR. Camp.

Valerianella olitoria Poll. — Moissons, coteaux, lieux herbeux. — AC.

— **Auricula** DC. — Moissons, champs cultivés. — RR.

— **dentata** Poll. — Champs cultivés, moissons. — AC. Camp. RR. Pold.

Dipsacées.

Scabiosa Succisa L. — Bois, prairies. — AC., AR. Camp.

— **Columbaria** L. var. **pratensis**. — Lieux herbeux. — Camp. : un pied sur les fortifications d'Anvers. — Introduit.

Knautia arvensis Coult. — Bois, bords des chemins, prairies. — AC. Camp. — Observé par M. J. Hennen à Merxem dans Pold.

Dipsacus sylvestris Mill. — Lieux incultes, bords des chemins, digues. — AR. Pold. Est très-rare dans Camp., où je ne l'ai observé qu'à Hingene.

— **fullonum** Mill. — Très-rarement cultivé.

Composées.

Onopordon Acanthium L. — Lieux incultes. — RR.

Cirsium lanceolatum Scop. — Lieux incultes, bords des chemins, prairies. — AC.

— **eriophorum** Scop. — Décombres. — Pold. : Anvers (un seul pied).

— **palustre** Scop. — Bords des eaux, lieux humides. — AC. Camp.

— **anglicum** DC. — Prairies humides. — M. Gilbert a bien voulu me montrer cette espèce croissant abondamment à Oeleghem dans Camp.

— **arvense** Scop. — Lieux incultes, prairies, bois, bords des chemins. — C.

— — var. **mite**. — Camp. : Cappellen (M. J. Hennen), Wyneghem (abondant).

— **oleraceum** Scop. — Alluvions des rivières, prairies, bois. — R. Camp.

Carduus crispus L. — Bords des chemins, prairies, lieux incultes. — AR., R. Pold. RR. Camp.

Lappa minor DC. — Bois, bords des chemins, lieux incultes. — AR.

— **officinalis** All. — Prairies humides, bords des mares. — RR.

Serratula tinctoria L. — Bois. — Camp. : Brasschaet (peu abondant).

Centaurea Jacea L. — Prairies. — AR.

— — var. à fleurons extérieurs non rayonnants. — C., CC.

— **Cyanus** L. — Moissons, bords des chemins. — C., CC. Camp. RR. Pold.

— **Calcitrapa** L. — Bords des chemins. — RR. Pold.

Bidens tripartitus L. — Bords des eaux. — AC.

— **cernuus** L. — Bords des eaux. — R. Camp.

— — var. **radiatus**. — Se rencontre çà et là dans Camp., mais est moins répandu que le type.

Rudbeckia laciniata L. — Bords des rivières. — Camp. : entre Lierre et Emblehem (très-abondant). — Naturalisé.

Achillea Millefolium L. — Prairies, bords des chemins, pelouses. — C.

— **Ptarmica** L. — Bords des eaux. — AR.

Obs. — J'ai observé en assez grande quantité, au bord d'un ruisseau à Vieux-Turnhout, une variété de cette espèce à fleurons ligulés à ligule très-courte.

Anthemis Cotula L. — Moissons, lieux cultivés, bords des chemins. — R. Camp.

— **arvensis** L. — Moissons, champs cultivés — R. Camp.

Cota tinctoria J. Gay. — Lieux incultes. — Camp. : Wyneghem (2 pieds). — Introduit.

Matricaria Chamomilla L. — Moissons, champs cultivés. — C. Camp. AC. Pold.

— **inodora** L. — Bords des fossés et des chemins, lieux herbeux. — AC. Pold.. Marit. R. Camp.

— — var. **maritima**. — Se rencontre dans Pold. et Marit.

Pyrethrum Leucanthemum Coss. et Germ. — Prairies. — C.

— **Parthenium** Sm. — Bords des chemins, lieux incultes. — RR Camp. — Naturalisé.

Chrysanthemum segetum L. — Moissons, champs cultivés. — AR. Camp..

Bellis perennis L. — Pelouses, prairies, bords des chemins. — CC.

Artemisia vulgaris L. — Bords des chemins, lieux incultes, bois. — AC. Camp. AR. Pold.

Artemisia maritima L. — Bas-fonds, digues. — R. Pold., Marit.

Tanacetum vulgare L. — Lieux incultes, bords des chemins. — AC. Camp. AR. Pold.

Gnaphalium uliginosum L. — Lieux humides. — AC. Camp.

— **luteo-album** L. — Fossés desséchés, lieux humides. — RR. Camp.

— **sylvaticum** L. — Bois, bruyères. — AR. Camp.

Antennaria dioica Gärtn. — Champs sablonneux incultes, dunes. — RR. Camp.

Filago germanica L. — Lieux sablonneux, bords des chemins. — RR.

Obs. — J'ai observé le *F. apiculata* G.-E. Smith entre Sichem et Averbode dans Camp. — La plante y était assez abondante.

— **minima** Fries. — Bruyères, bords des chemins. — AC. Camp.

Pulicaria dysenterica Gärtn. — Bords des fossés, prairies humides, bords des chemins. — AC.

Inula Conyza DC. — Bords des chemins, vieux murs. — Camp. : Malines (assez abondant.)

Solidago Virga-aurea L. — Bois, taillis. — AC. Camp.

— **canadensis** L. — Souvent cultivé dans les jardins.

Erigeron acris L. — Bords des chemins, lieux herbeux. — AC. Camp. RR. Pold.

— **canadensis** L. — Lieux incultes, bords des chemins. — AC. Camp. AR. Pold.

Stenactis annua Nees. — Bords des chemins, lieux incultes. — Camp. : Malines. — Naturalisé. — Cette espèce y était abondante en 1875, mais il paraît qu'elle n'y existe plus.

Aster Tripolium L. — Bords des eaux, bas-fonds. — AC. Marit. R. Pold.

— — var. **luteus**. — Se rencontre çà et là.

Senecio vulgaris L. — Champs cultivés et incultes. — C.

— **sylvaticus** L. — Bois, taillis, champs sablonneux. — AR. Camp.

— **erucaefolius** L. — Bords des fossés et des chemins, lieux herbeux. — AC. Pold.

— **Jacobaea** L. — Bords des fossés, prairies. — AC.

— **aquaticus** Huds. — Prairies humides, bords des eaux. — R.

— **paludosus** L. — Bords des eaux. — RR. Camp.

— **nemorensis** L. var. **Fuchsii** — Bois. — R. Camp.

Eupatorium cannabinum L. — Bords des eaux, bois, buissons. — AC. Camp. RR. Pold.

Tussilago Farfara L. — Bords des chemins, lieux incultes, champs cultivés. — AC.

Petasites officinalis Mönch. — Bords des rivières et des ruisseaux, prairies. — R. Camp. RR. Pold.

Lampsana communis L — Champs. — AC.

Arnoseris minima Link. — Moissons, lieux sablonneux. — AR Camp.

Cichorium Intybus L. — Bords des chemins. — RR. Camp.

— **Endivia** L. — Cultivé.

Hypochoeris glabra L. — Champs cultivés, moissons. — AC. Camp.

— **radicata** L. — Lieux herbeux. — AC.

Thrincia hirta Roth. — Prairies, bords des chemins. — C.

Leontodon hispidus L. — Bois, prairies. — R. Camp.

— **autumnalis** L. — Lieux herbeux, bords des chemins — AC., C.

Picris hieracioides L. — Bois, buissons, lieux incultes. — R. Camp. — Observé par M. J. Hennen dans Pold. à Austruweel.

Tragopogon pratensis L. — Prairies, bords des chemins. — AR.

— — var. **minor**. — Beaucoup moins répandu que le type.

— **porrifolius** L. — Digues, lieux herbeux. — RR. Pold. — Naturalisé.

Scorzonera hispanica L. — Cultivé.

Taraxacum officinale Weber. — Prairies, bords des chemins. — CC.

— — var. **palustre**. — RR. Camp.

Lactuca sativa L — Cultivé.

— **Scariola** L. — Lieux incultes, décombres. — Camp. : Anvers (très-abondant.)

— **saligna** L. — Bords des fossés et des chemins. — RR. Pold.

— **muralis** Less. — Vieux murs, bois. — RR. Camp.

Sonchus oleraceus L. — Champs cultivés et incultes, bords des chemins. — AC.

— **asper** All. — Champs, bords des chemins, lieux incultes. — AC.

— **arvensis** L. — Champs cultivés, bords des eaux. — AC. Marit. AR. Camp., Pold.

— **palustris** L. — Bords de l'Escaut. — Marit. : Tête-de-Flandre, Austruweel. — Je n'ai pas encore observé cette espèce à Calloo, où elle est signalée.

Barkhausia taraxacifolia DC — Bords des chemins, lieux herbeux. — AC. Pold. RR. Camp.

— **setosa** DC. — Champs cultivés. — J'en ai trouvé un seul pied dans Camp. — Introduit.

Crepis virens Vill. — Prairies, bords des chemins. — C., AC.

— **biennis** L. — Prairies, bords des fossés. — AC.

— **paludosa** Mönch — Bois, prairies humides, bords des fossés. — R., RR. Camp.

Hieracium Pilosella L. — Lieux herbeux, bords des chemins, coteaux. — C. Camp. Pold. : çà et là sur les digues.

— **Auricula** L. — Bords des chemins, lieux herbeux. — AR. Camp.

— **murorum** L. — Bois, haies. — AR. Camp.

— **vulgatum** Fries. — Bois. — AR Camp.

— **tridentatum** Fries. — Bois. — R., RR. Camp.

— **boreale** Fries. — Bois. — RR. Camp.

— **umbellatum** L. — Bois, bruyères, dunes, bords des chemins. — C. Camp.

Ambrosiacées.

Xanthium strumarium L. — Décombres. — Très-rarement introduit dans Camp.

— **spinosum** L. — Décombres, lieux incultes, bords des chemins. — Se rencontre souvent introduit dans les environs immédiats d'Anvers.

Amarantacées.

Amarantus retroflexus L. — Décombres, bords des chemins. — RR. — Introduit.

— **sylvestris** Desf. — Lieux incultes. — Observé par M. J. Hennen à Merxem dans Camp. — Introduit.

Albersia Blitum Kunth. — Lieux incultes, bords des chemins, voisinage des habitations. — RR. Camp.

Salsolacées.

Atriplex farinosa Dmrt. — Décombres. — Camp. : Anvers (un seul pied).

— **hastata** L. — Lieux incultes, bords des chemins, lieux herbeux. — C. Camp., Pold. CC. Marit.

— — var. **patula**. — Se rencontre çà et là.

— **litoralis** L. — Bas-fonds. — RR. Marit.

Halimus partulacoides Wallr. — Bas-fonds, lieux herbeux aux bords de l'Escaut. — AR. Marit.

Spinacia oleracea L. — Cultivé.

— **glabra** Mill. — Cultivé.

Beta vulgaris L — Cultivé.

Chenopodium polyspermum L — Champs cultivés. — AR

— **foetidum** Lmk. — Décombres, lieux incultes. — RR. Camp. (vers sa limite avec Pold.).

— **ficifolium** Sm. — Lieux incultes, bords des chemins. — R.

— **opulifolium** Schrad. — Décombres, lieux incultes. — RR. Camp.

— **album** L. — Lieux incultes et cultivés, décombres. — C.

— **murale** L. — Lieux incultes, champs cultivés, bords des chemins. — R., RR.

— **ambrosioides** L. — Était abondant en 1879, mais introduit, dans le voisinage des lavoirs de laines à Anvers et à Merxem dans Camp.

Roubieva multifida Moq.-Tand. — Introduit en petite quantité à Anvers, dans Camp.

Blitum rubrum Rchb. — Décombres, lieux incultes, bords des chemins. — AR.

— **Bonus-Henricus** Rchb. — Décombres. — Un seul pied en a été trouvé par M. J. Hennen à Merxem dans Pold.

Salicornia herbacea L. — Bas-fonds, bords des eaux saumâtres. — R., mais abondant dans ses habitations. Pold., Marit.

Suaeda maritima Dmrt. — Bas-fonds, bords des eaux saumâtres. — AR. Marit.

Polygonées.

Rumex maritimus L. — Lieux humides et incultes, bords des chemins. — RR. Camp., Pold., Marit.

— **palustris** Sm. — Bords des eaux, lieux humides et incultes. — AR. Pold., Marit.

— **obtusifolius** L. — Bords des eaux et des chemins, prairies. — AC. Camp. R. Pold.

— **crispus** L. — Prairies, bords des fossés et des chemins. — AC.

— **Hydrolapathum** Huds. — Bords des eaux. — AC. Camp. AC, AR. Pold.

— **conglomeratus** Murr. — Bords des eaux et des chemins. — C.

Rumex sanguineus L. — Bois, bords des eaux. — AR. Camp.

— **Acetosa** L. — Prairies, champs cultivés. — C.

— **Acetosella** L. — Champs cultivés, moissons, lieux incultes. — CC. Camp. R. Pold.

Polygonum Bistorta L. — Prairies, lisière des bois, bords des eaux. — R. Camp.

— **amphibium** L. — Fossés, canaux, étangs, lieux humides. — AC. La var. *terrestre* est beaucoup plus répandue dans Pold. que la var. *natans*. Dans Camp. se rencontrent les deux variétés en proportion à peu près égale.

— **lapathifolium** L. — Champs cultivés et incultes, lieux humides. — AC.

— **Persicaria** L. — Champs cultivés, lieux humides. — C.

— **Hydropiper** L. — Bords des eaux, fossés desséchés. — C. Camp. — Cette espèce paraît faire défaut dans Pold., où je ne l'ai pas encore observée.

— **mite** Schrk. — Fossés desséchés, bords des eaux. — AC. Pold. AR. Camp.

— — var. **minus**. — RR. Camp.

— **aviculare** L. — Lieux incultes et cultivés, bords des chemins. — C., CC.

— **Convolvulus** L. — Moissons, lieux cultivés. — C.

— **dumetorum** L. — Buissons, haies. — AR. Camp.

Fagopyrum esculentum Mönch. — Cultivé en grand.

— **tataricum** Gärtn. — Se rencontre souvent, à l'état d'introduction, dans les champs parmi l'espèce précédente.

Cannabinées.

Cannabis sativa L. — Rarement cultivé.

Humulus Lupulus L. — Bois, haies, buissons. — AC. Camp. AR., R. Pold. — Manque souvent dans le sable pur.

Ulmacées.

Ulmus montana With. — Bois. — RR. Camp., mais peut-être planté.

— **campestris** L. — Très-souvent planté.

— — var. **suberosa** (*U. suberosa* Ehrh.). — Se rencontre dans Camp. avec l'apparence indigène.

Urticées.

Urtica urens L. — Lieux pierreux, decombres, voisinage des habitations. — AC.

— **dioica** L. — Bords des fossés, lieux incultes, haies, buissons. — C.

Parietaria ramiflora Mönch. — Vieux murs. — Camp. : Malines — Naturalisé.

Hippuridées.

Hippuris vulgaris L. — Fossés. — AC. Pold. RR. Camp.

— — var. **fluviatilis**. — R. Pold.

Euphorbiacées.

Euphorbia helioscopia L. — Champs cultivés, jardins. — AC.

— **platyphyllos** L. — Bords des chemins. — Camp. : Merxem (un seul pied).

— **dulcis** L. — Bois. — Camp. : Exterlaer-sous-Deurne. — M. le Dr H. Van Heurck a bien voulu m'indiquer l'habitation de cette espèce.

— **Cyparissias** L. — Camp. : introduit en petite quantité sur les fortifications d'Anvers.

— **exigua** L. — Champs cultivés. — R., mais abondant dans ses habitations. Pold.

— **Peplus** L. — Champs cultivés. — AC.

Mercurialis annua L. — Champs cultivés, bords des chemins. — AC.

— **perennis** L. — Bois. — RR. Camp., mais abondant dans ses habitations.

Callitrichinées.

Callitriche vernalis Kütz. — Fossés, ruisseaux. — C.

— — var. **obtusangula**. — J'ai observé cette var. dans Pold.

— **hamulata** Kütz. — Fossés. — Camp. : 'S Gravenwesel.

— **stagnalis** Scop. — Fossés. — AC.

— **autumnalis** L. — Canaux. — Camp. : Wyneghem (très-abondant).

Cératophyllées.

Ceratophyllum demersum L. — Fossés. — AC., AR.

— **submersum** L. — Fossés. — RR. Pold., Marit.

Juglandées.

Juglans regia L. — Cultivé.

Cupulifères.

Fagus sylvatica L. — Bois. — R. Camp., mais souvent planté.
Castanea sativa Mill. — Cultivé.
Quercus pedunculata Ehrh. — Bois — AR. Camp.
— **sessiliflora** Sm. — Bois. — Paraît RR. dans Camp.
Corylus Avellana L. — Bois, haies, taillis. — AR. Camp., mais manque dans bien des localités.
Carpinus Betulus L. — Bois. — R. Camp.

Salicinées.

Salix alba L. — Bords des eaux. — AC. Camp. AR. Pold.
— **fragilis** L. — Bords des eaux. — AC. Camp. AR. Pold.
— **babylonica** L. — Cultivé.
— **amygdalina** L. — Bords des eaux. — AC. Camp. AR. Pold.
— **purpurea** L. — Bords des eaux. — RR. Pold.
— **viminalis** L. — Bords des eaux. — AR., mais souvent planté.
Obs. — Le *S. Seringeana* Gaud. se rencontre parfois, surtout dans Camp., mais peut-être planté.
— **cinerea** L. — Lieux frais. — RR. Camp.
— **aurita** L. — Bords des eaux, bois. — AC. Camp. AR., R. Pold.
— **caprea** L. — Bords des eaux, bois. — AC. Camp. AR. Pold.
— **repens** L. — Lieux sablonneux, dunes, lieux humides. — C. Camp. RR. Pold.
Populus tremula L. — Bois. — AC. Camp.
— **alba** L. — Planté.
— **canescens** Sm. — Planté.
— **monilifera** Ait. — Planté.
— **nigra** L. — Planté.
— **pyramidalis** Rozier. — Planté.

Bétulinées.

Betula alba L. — Bois. — C. Camp.
— — var. **pubescens** (*B. pubescens* Ehrh.). — AR. Camp.
Alnus glutinosa Gärtn. — Bois humides, bords des eaux. — AC. Camp. RR. Pold.

Myricées.

Myrica Gale L. — Marais, prairies et bruyères humides. — AR. Camp.

Platanées.

Platanus orientalis L. — Planté.
— **acerifolia** Willd. — Planté.
— **occidentalis** L. — Planté.

Abiétinées.

Pinus sylvestris L. — Cultivé.
— **maritima** Lmk. — Cultivé.
— **Strobus** L. — Cultivé.
Larix decidua Mill. — Cultivé.
Abies excelsa DC. — Cultivé.
Picea pectinata Loudon. — Cultivé.

Cupressinées.

Juniperus communis L. — Lieux arides, dunes. — RR. Camp.
Taxus baccata L. — Cultivé.

Alismacées.

Alisma Plantago L. — Fossés, étangs, canaux. — AC., C.
— — var. **lanceolatum.** — R.
— — var. **graminifolium.** — RR. Camp.
— **ranunculoides** L. — Marais, bords des eaux. — AR., R. Camp.
— — var. **repens.** — RR. Camp.
— **natans** L. — Fossés, mares. — AR., R. Camp. Pold. : Austruweel.
Sagittaria sagittifolia L. — Fossés, étangs, ruisseaux. — AC., AR.

Butomées.

Butomus umbellatus L. — Bords des eaux. — AC. Pold. AR. Camp.

Liliacées.

Tulipa sylvestris L. — Lieux herbeux, digues. — RR., mais très-abondant dans ses habitations.

Ornithogalum umbellatum L. — Champs cultivés. — AR. Camp. Pold. : Merxem.

Gagea sylvatica Loudon. — Bois frais. — Camp. : Wilryck, Aertselaer (très-abondant).

Allium vineale L. — Bords des chemins, lieux herbeux, haies. — AR., R. Camp., Pold., Marit.

— — var. **compactum** (*A. compactum* Thuill.). — Moins répandu que le type.

— **ursinum** L. — Bois frais. — Camp. : Wilryck (M. E. Van Meerbeeck).

Muscari botryoides Mill. — Champs cultivés, lieux frais. — RR. Camp

Narthecium ossifragum Huds. — Bruyères et marais tourbeux. — R., mais très-abondant dans ses habitations. Camp.

Asparaginées.

Asparagus officinalis L. — Cultivé en grand.

Convallaria maialis L. — Bois. — AR. Camp.

Polygonatum multiflorum All. — Bois, haies. — AR. Camp.

Maianthemum bifolium Schmidt. — Bois. — AC , AR. Camp.

Paris quadrifolia L. — Bois. — R., RR. Camp.

Iridées.

Iris Pseudo-Acorus L. — Bords des eaux. — AC.

Amaryllidées.

Leucoium aestivum L. — Bords des eaux, prairies humides. — Marit.: Austruweel, Tête-de-Flandre. Camp. : entre Lierre et Emblehem. — Très-abondant.

Galanthus nivalis L. — Haies, bords des chemins, lieux frais dans le voisinage des habitations. — R. Camp.

Orchidées.

Orchis Morio L. — Prairies. — RR. Camp.

— **maculata** L. — Bois, bruyères. — AC., AR. Camp.

— **latifolia** L. — Prairies humides. — AC. Camp. R. Pold.

— — var. **incarnata** (*O. incarnata* L.). — Camp. : Hoboken.

Platanthera bifolia Rchb. — Bruyères. — RR. Camp.

Epipactis latifolia All. — Bois, taillis, haies, bords des chemins. — AR., R. Camp. RR. Pold.

Neottia ovata Bluff et Fing. — Bois, haies. — AC., AR. Camp.

— **Nidus-avis** Rich. — Bois frais. — Camp. : Broechem. (M. Edm. Wynants).

Malaxis paludosa Sw. — Bords des marais. — RR. Camp.

Hydrocharidées.

Hydrocharis Morsus-ranae L. — Fossés, étangs, mares. — AC.

Stratiotes aloides L. — Étangs, fossés. — AC., AR. dans quelques localités. — Je n'ai pas encore observé cette espèce à une distance de plus de 4 lieues d'Anvers.

Elodea canadensis Rich. — Fossés, étangs, canaux. — CC.

Joncaginées.

Triglochin palustris L. — Bords des eaux, prairies humides. — AR., R.

— **maritima** L. — Bas-fonds, bords des eaux saumâtres. — AC. Marit. RR. Pold.

Potamées.

Potamogeton natans L. — Étangs, fossés, canaux, mares. — AC.

— **polygonifolius** Pourret. — Fossés, mares. — R. Camp.

— **alpinus** Balb. — Ruisseaux, rivières, mares. — RR. Camp.

— **lucens** L. — Fossés, étangs, canaux. — AC. Pold. AR. Camp.

— **crispus** L. — Fossés, mares, canaux. — AC.

— **perfoliatus** L. — Canaux. — R. Camp.

— **densus** L. var. **serratus**. — Fossés, canaux. — RR. Marit., Camp.

— **acutifolius** Link. — Fossés. — Pold. : Austruweel.

Obs. — J'ai observé cette espèce dans Camp. à Hingene.

— **obtusifolius** M. et K.? — Canaux. — Camp. : Wyneghem. — Pour autant que j'ai pu en juger, le bout de tige que j'ai trouvé appartient à cette espèce.

— **pusillus** L. — Fossés, canaux. — AC. Pold. AR. Camp.

— **mucronatus** Schrad. — Fossés, canaux. — RR.

— **trichoides** Chamisso et Schlecht. — Fossés, canaux. — Camp. : Wyneghem. Pold. : Austruweel. — Très-abondant.

— **pectinatus** L. — Fossés, canaux. — AC.

— — var. **flabellatus**. — RR.

Zannichellia palustris L. var. **pedicellata**. — Fossés. — AC., AR. Pold.

Naïadées.

Caulinia minor Coss. et Germ. — Canaux. — RR. Camp.

Lemnacées.

Lemna trisulca L. — Fossés, mares. — AC.
— **minor** L. — Fossés, mares, ruisseaux. — C.
— **gibba** L. — Fossés, mares, ruisseaux. — R.
— **polyrrhiza** L. — Fossés, mares. — AR. Camp. R. Pold.

Aroïdées.

Arum maculatum L. — Bois frais, haies. — AC. Camp., mais seulement au sud du canal de la Campine.
Calla palustris L. — Marais tourbeux. — Camp. : Oolen et Gheel (abondant).
Acorus Calamus L. — Bords des eaux. — R. Camp.

Typhacées.

Typha latifolia L. — Étangs, fossés, mares. — R.
— **angustifolia** L. — Mares, étangs, fossés. — AR. Pold. RR. Camp.
Sparganium ramosum Huds. — Fossés, bords des étangs. — AC.
— **simplex** Huds. — Fossés. — AR. Camp. R. Pold.
— — var. **fluitans**. — RR. Camp.
— **minimum** Fries. — Fossés, marais. — RR. Camp.

Joncées.

Juncus conglomeratus L. — Bords des eaux et des chemins. — AC., C Camp. R. Pold.
— **effusus** L. — Bords des chemins et des eaux. — C. Camp. AR. Pold.
— **glaucus** Ehrh. — Bords des eaux et des chemins. — C. Pold. AR. Camp.
— **filiformis** L. — Prairies et bruyères humides. — R. Camp.
— **supinus** Mönch. — Marais, lieux humides — AC. Camp. R. Pold.
— — var. **fluitans**. — R. Camp.
— **lamprocarpus** Ehrh. — Bords des eaux, lieux humides. — C. Camp. AC. Pold.
— **sylvaticus** Reich. — Bords des eaux. — R. Camp.
— **obtusiflorus** Ehrh. — Fossés, bords des étangs. — Pold. : Eeckeren, Merxem.
— **squarrosus** L. — Bruyères humides. — R., mais abondant dans ses habitations. Camp.

Juncus tenuis Willd. — Bords des chemins, bois. — AC. Camp.
— **compressus** Jacq. — Lieux herbeux humides, bords des fossés. — AC. Pold.
— — var. **Gerardi** (*J. Gerardi* Lois.). — Plus répandu que le type.
— **Tenageia** Ehrh. — Lieux humides. — RR. Camp.
— **bufonius** L. — Lieux incultes, bords des chemins et des eaux. — C. Camp. AC. Pold.
Luzula vernalis DC — Bois. — AC. Camp., mais seulement au sud du canal de la Campine, car au nord du canal, je ne l'ai observé qu'entre Brasschaet et Schooten.
— **campestris** DC. — Prairies, lieux herbeux. — CC. Camp.
— **multiflora** Lej. — Bois, bords des chemins. — R. Camp.
— — var. **congesta** Lej. — R. Camp.

Cypéracées.

Carex pulicaris L. — Prairies et bruyères humides ou marécageuses. — RR. Camp.
— **disticha** Huds. — Bords des eaux, prairies humides. — AC.
— **arenaria** L. — Lieux sablonneux, dunes. — AC. Camp.
— **vulpina** L. — Bords des eaux, lieux herbeux humides. — C.
— — var. **nemorosa**. — R.
— **muricata** L. — Lieux herbeux. — R.
— **teretiuscula** Good. — Prairies humides. — Camp. : abondant à Oeleghem (M. Gilbert).
— **paniculata** L. — Bords des eaux, marais. — RR. Camp.
— **leporina** L. — Pâturages, lieux herbeux. — AC. Camp.
— **echinata** Murr. — Prairies humides, bois, fossés. — AR. Camp.
— **remota** L. — Bois humides, bords des fossés. — AC. Camp.
— **elongata** L. — Bords des fossés, marais. — R. Camp.
— **canescens** L. — Marais, lieux humides. — R. Camp.
— **Goodenowii** J. Gay. — Prairies, lieux herbeux, bords des eaux. — AC. Camp. Pold. : abondant entre Eeckeren et Wilmarsdonck.
— **acuta** L. — Bords des eaux, lieux humides. — AC. Camp. Pold. : abondant entre Eeckeren et Wilmarsdonck.
— **stricta** Good. — Bords des eaux. — R. Camp.
— **glauca** Scop. — Bords des eaux, prairies et bruyères humides. — AC. Camp. RR. Pold.
— **pallescens** L. — Bois. — AR. Camp.

Carex panicea L. — Prairies et bruyères humides, bords des eaux. — AC. Camp. RR. Pold.

— **pilulifera** L. — Bois, bruyères, bords des eaux. — AC. Camp.

— **praecox** Jacq. — Pelouses, prairies, bois. — AC. Camp.

— **flava** L. — Bruyères et prairies humides ou tourbeuses. — AR. Camp.

— **Hornschuchiana** Hoppe. — Prairies et bruyères tourbeuses. — RR. Camp.

Obs. — Le *C. fulva* Good. est RR. Camp.

— **distans** L. — Bords des eaux. — RR. Camp.

— **sylvatica** Huds. — Bois. — AR. Camp.

— **Pseudo-Cyperus** L. — Bords des eaux, fossés, marais. — AR. Camp.

— **ampullacea** Good. — Bords des eaux, lieux humides ou marécageux. — R. Camp.

— **vesicaria** L. — Marais, bords des eaux, lieux humides. — AR. Camp.

— **paludosa** Good. — Fossés, bords des eaux. — AC. Camp. Pold. : Oorderen (abondant).

— — var. **Kochiana**. — Camp. : entre Oeleghem et Schilde (M. Gilbert).

— **riparia** Curt. — Bords des eaux, fossés. — AR. Pold. R. Camp., Marit.

— **hirta** L. — Bords des eaux, lieux humides. — AC., AR.

— — var. **hirtaeformis**. — RR.

Rhynchospora alba Vahl. — Bruyères humides ou tourbeuses. — R. Camp.

— **fusca** R. et S. — Bruyères humides ou tourbeuses. — R. Camp.

Heleocharis palustris R. Br. — Bords des eaux, fossés, étangs. — AC.

— **uniglumis** Link. — Bords des eaux, marais, fossés. — AR. Pold. RR. Camp.

— **multicaulis** Koch. — Bords des eaux, mares, tourbières. — R. Camp.

— **acicularis** R. Br. — Marais, lieux inondés. — RR. Camp.

Scirpus pauciflorus Lightf. — Lieux humides. — RR. Camp.

— **caespitosus** L. — Bruyères humides ou tourbeuses. — AR. Camp.

— **fluitans** L. — Fossés, mares. — AR. Camp.

— **setaceus** L. — Marais, lieux humides. — AR., R. Camp.

— **lacustris** L. — Bords des eaux, étangs. — C. Marit. AC. Pold. R. Camp.

— — var. **Tabernaemontani**. — RR. Marit., Pold.

— **triqueter** L. — Bords des eaux. — RR. Camp., Marit.

— **maritimus** L. — Bords des eaux, étangs, fossés. — C. Marit., Pold. R. Camp.

Scirpus maritimus L. var. **compactus**. — Se rencontre parfois dans Marit.

— — var. **monostachys**. — RR. Marit.

— **sylvaticus** L. — Bords des eaux, lieux humides. — AR. Camp.

Eriophorum angustifolium Roth. — Marais, tourbières, bruyères et prairies humides — AC. Camp.

— **latifolium** Hoppe. — Prairies humides ou marécageuses. — RR. Camp.

Cyperus fuscus L. — Lieux marécageux. — Pold. : Tête-de-Flandre (un seul pied).

Graminées.

Leersia oryzoides Sw. — Bords des eaux. — RR. Camp.

Anthoxanthum odoratum L. — Prairies, pâturages, lieux herbeux. — C. Camp. AC. Pold.

— — var. **villosum**. — Se rencontre çà et là.

Phalaris canariensis L. — Cultivé.

Baldingera arundinacea Dmrt. — Bords des eaux. — AC. Camp., Pold., Marit.

Oplismenus Crus-galli Kunth. — Champs cultivés. — C. Camp. RR. Pold.

Digitaria sanguinalis Scop. — Champs cultivés, bords des chemins, jardins. — R. Camp.

— **filiformis** Köl. — Lieux incultes, bords des chemins. — AC. Camp. Pold. : (rare Merxem), Tête-de-Flandre (abondant).

Setaria viridis P. Beauv. — Champs cultivés. — AC. Camp.

— **glauca** P. Beauv. — Champs cultivés, lieux incultes, bords des chemins. — AR. Camp. — J'ai rencontré cette espèce dans Pold. et Marit., mais seulement un pied dans chaque zone.

— **italica** P. Beauv. — Cultivé.

Panicum miliaceum L. — Cultivé.

Alopecurus geniculatus L. — Prairies humides, bords des fossés. — AR. Pold., Marit. R. Camp.

— **pratensis** L. — Prairies, lieux herbeux — C. Camp. AR. Pold.

— **agrestis** L. — Champs cultivés. — AC., AR.

Phleum pratense L. — Prairies, bords des chemins. — AC., AR.

Agrostis vulgaris With. — Pâturages, lieux herbeux, bords des chemins. — C. Camp. AC. Pold.

Agrostis alba L. — Moissons, bords des chemins, lieux herbeux. — AC. Pold. C. Camp.

— **canina** L — Champs et bords des chemins sablonneux. — AR Camp.

Apera Spica-venti P. Beauv. — Moissons — C. Camp. AR. Pold.

Calamagrostis epigeios Roth. — Bords des eaux, bois. — AR. Camp.

— **lanceolata** Roth. — Bois, bords des eaux. — R. Camp.

Ammophila arenaria Link. — Dunes. — Camp. : assez abondant à Calmpthout.

Polypogon monspeliense Desf. — Décombres. — Très-rarement introduit dans Camp.

Milium effusum L. — Bois. — AC. Camp., mais seulement au sud du canal de la Campine.

Corynephorus canescens P. Beauv. — Lieux sablonneux incultes. — AR., mais très-abondant dans ses habitations. Camp.

Aira praecox L. — Bords des chemins sablonneux, lieux incultes. — AC. Camp.

— **caryophyllea** L. — Moissons, champs cultivés, bords des chemins. — AC. Camp.

Deschampsia caespitosa P. Beauv. — Bois. — AC. Camp.

— **flexuosa** Nees. — Bois, bruyères. — AC. Camp.

— **discolor** R et S. — Marais, bords des mares, bruyères humides, fossés. — R. Camp.

Avena pubescens L. — Lieux herbeux. — RR. Camp.

— **sativa** L. — Cultivé.

— **orientalis** Schreb. — Très-rarement cultivé.

— **strigosa** Schreb — Introduit dans les moissons d'*A. sativa*.

— **fatua** L. — Moissons, lieux cultivés. — AR. Pold. RR. Camp — Introduit.

Trisetum flavescens P. Beauv. — Prairies, bords des chemins. — AC

Arrhenatherum elatius M. et K. — Prairies, lieux herbeux. — AC.

— — var. **bulbosum**. — Observé par M. J. Hennen au bord d'un chemin à Cappellen dans Camp.

Holcus lanatus L. — Prairies. — C.

— **mollis** L. — Bois, lieux cultivés et herbeux. — AC. Camp.

Danthonia decumbens DC. — Bois. — AR., R. Camp.

Koeleria cristata Pers — Lieux herbeux. — Camp. : abondant, mais introduit, sur les fortifications d'Anvers

Phragmites communis Trin. — Bords des eaux, lieux humides. — C.

Cynosurus cristatus L. — Prairies, bords des chemins. — AC.

Melica uniflora Retz. — Bois. — RR. Camp.

Molinia caerulea Mönch. — Lieux sablonneux humides, bois, bruyères tourbeuses. — C. Camp.

Catabrosa aquatica P. Beauv. — Fossés, prairies marécageuses. — RR. Camp.

Glyceria fluitans R. Br. — Fossés, étangs, ruisseaux. — C.

— **aquatica** Wahlberg. — Bords des eaux. — AC.

— **distans** Wahlenberg. — Bords des eaux, lieux herbeux, bords des chemins. — AC., AR. Marit., Pold. R., RR. Camp.

— **maritima** Wahlberg. — Bords des eaux saumâtres. — AR. Marit.

Briza media L. — Lieux herbeux, bords des chemins. — AR., mais abondant dans ses habitations. Camp. RR. Pold.

— **minor** L. — Moissons, bords des champs. — Camp. : très-abondant à Wilryck et à Contich. — Introduit.

Poa annua L. — Prairies, pelouses, champs, bords des chemins. — CC.

— **nemoralis** L. — Bois. — AC., AR. Camp.

— **trivialis** L. — Bords des eaux, prairies, lieux humides. — C. Camp. AC. Pold.

— **pratensis** L. — Prairies, bords des chemins, bois — C.

— — var. **angustifolia**. — Moins répandu que le type.

Dactylis glomerata L. — Prairies, lieux herbeux. — AC.

Bromus sterilis L. — Bords des chemins, lieux arides. — C. Camp. R. Pold.

— **tectorum** L. — Bords des chemins, lieux incultes. — Camp.: Anvers. Pold. : Austruweel. — Je n'ai plus revu cette espèce aux localités citées.

— **erectus** Huds. — Lieux herbeux. — Camp. : abondant, mais introduit, sur les fortifications d'Anvers, d'où il commence à se répandre dans les environs.

— **arvensis** L. — Bords des chemins, lieux incultes. — RR. — J'en ai trouvé quelques pieds à Anvers et à Austruweel, où je ne l'ai plus revu.

— **patulus** M. et K. — Bords des chemins. — Très-rarement introduit dans Pold.

— **mollis** L. — Prairies, bords des chemins, lieux herbeux. — C.

— — var. **leiostachys**. — S'observe çà et là.

Bromus racemosus L. var. **commutatus**. — Champs cultivés. — Pold. : Merxem. — Peu abondant.

— **secalinus** L. — Moissons. — AR.

Obs. — Les var. *secalinus*, *submuticus* et *nitidus* existent çà et là.

Festuca sciuroides Roth. — Bords des chemins, lieux sablonneux. — AR. Camp.

— **Pseudo-Myuros** Soy.-Will — Bords des chemins, lieux sablonneux. — R. Camp.

— **rubra** L. — Bords des chemins, lieux herbeux, bois. — C.

— — var. **arenaria**. — Camp. : sur les dunes à Calmpthout.

— **duriuscula** L. — Bords des chemins, lieux herbeux. — R. Camp.

— **ovina** L. — Lieux sablonneux, bords des chemins, bruyères. — C. Camp.

— **elatior** L. — Prairies, lieux herbeux, bords des chemins. — CC. Pold. C. Camp.

Obs. — Le *F. loliacea* Curt. se rencontre dans Camp.

— **arundinacea** Schreb. — Bords des eaux, lieux herbeux. — AC. Marit. AR. Camp. R. Pold.

— **gigantea** Vill. — Bois. — R. Camp.

Brachypodium sylvaticum P. Beauv. — Bois. — R. Camp. — Se rencontre presque toujours en compagnie de l'espèce précédente.

Lolium perenne L. — Pelouses, lieux herbeux, bords des chemins. — C., CC. — La var. *ramosum*, à épi rameux, se rencontre parfois, surtout dans Pold.

— **multiflorum** Lmk. — Souvent semé en prairies artificielles.

— **temulentum** L. — Moissons. — Pold. : Merxem. (abondant).

— **remotum** Schrk. — Champs de lin. — Camp. : Reeth.

Hordeum murinum L. — Bords des chemins, lieux incultes. — C. Camp. AR. Pold.

— **maritimum** With. — Digues aux bords de l'Escaut, lieux sablonneux humides. — AR. Marit.

— **secalinum** Schreb. — Lieux herbeux, prairies, digues. — C. Pold.. Marit. RR. Camp.

— **distichon** L. — Cultivé.

— **vulgare** L. — Cultivé.

Secale cereale L. — Cultivé.

Triticum vulgare Vill. — Cultivé.

Agropyrum pungens R. et S. — Bords des chemins, lieux herbeux. — AC , AR. Marit., Pold

Agropyrum repens P. Beauv. — Champs, bords des chemins, buissons. — CC. Camp. C. Pold.

Lepturus filiformis Trin. — Bas-fonds, bords des eaux saumâtres. — RR. Marit.

Nardus stricta L. — Bruyères, lieux herbeux, bords des chemins. — AC. Camp.

Fougères.

Polypodium vulgare L. — Bois. — AC. Camp.

— **Dryopteris** L. — Bois. — RR. Camp.

Pteris aquilina L. — Bois, bruyères. — AC. Camp.

Blechnum Spicant With. — Bois humides. — AC., AR. Camp.

Scolopendrium vulgare Sm. — Puits. — RR. Camp.

Asplenium Filix-femina Bernh. — Bois, bords des fossés ombragés. — AC. Camp.

— **Ruta-muraria** L. — Vieux murs. — R. Camp.

Cystopteris fragilis Bernh. — Bords des ruisseaux ombragés. — RR. Camp.

Polystichum Filix-mas Roth. — Bois, bords des fossés ombragés. — AR. Camp.

— **spinulosum** DC. — Bois, lieux ombragés. — AC. Camp.

— — var **dilatatum** — AC., AR. Camp.

Osmunda regalis L. — Bords des fossés ombragés, lisière des bois, lieux humides. — R. Camp.

Marsiléacées.

Pilularia globulifera L — Tourbières, marais, fossés.— R., RR. Camp.

Lycopodiacées.

Lycopodium inundatum L. — Bruyères humides et tourbeuses. — AR., mais très-abondant dans ses habitations. Camp.

— **clavatum** L. — Bruyères, bois. — R. Camp.

— **Selago** L. — Sables humides. — Camp. (une douzaine de pieds).

Équisétacées.

Equisetum arvense L. — Champs cultivés, bords des chemins. — C.

— — var. **nemorosum** — AC., AR.

— **maximum** Lmk. — D'après ce qui m'a été rapporté, cette espèce est RR. Camp., mais je ne l'y ai pas observée.

Equisetum limosum L. — Fossés, étangs. — AC.
— **palustre** L. — Bords des eaux, prairies humides. — AC.
— — var. **polystachyum**. — AR. Camp.
— **hyemale** L. — Bois frais. — RR. Camp.

Characées.

Chara hispida L. — Fossés. — R. Pold. RR. Camp.
— **foetida** Al. Br. — Fossés, canaux. — AR. Pold. R. Camp.
— **fragilis** Desv. — Fossés, canaux, mares. — R. Camp.
Nitella flexilis Agardh. — Fossés. — RR. Pold.
— **translucens** Agardh. — Fossés. — RR. Pold.
— **opaca** Agardh. — Canaux. — RR. Camp.
— **intricata** Agardh. — Canaux. — RR. Camp.

MOUSSES.

Éphémérées.

Ephemerum serratum Hpe. — Sur la terre. — Wilryck. — F.

Physcomitrellées.

Physcomitrella patens Sch. — Sur la terre. — Anvers. — F.

Phascées.

Phascum cuspidatum Schreb. — Sur la terre. — Entre Anvers et Hoboken, Anvers, entre Anvers et Eeckeren. — F.

Pleuridiées.

Pleuridium nitidum Br. Eur. — Sur la terre humide. — Entre Gheel et Oolen. — F.
— **subulatum** Br. Eur. — Sur la terre humide. — Bois à Wilryck, bruyères à Schilde. — F.

Weisiées.

Weisia viridula Brid. — Sur la terre. — Entre Lierre et Emblehem, entre Contich et Duffel. — F.
Dicranoweisia cirrhata Lind. — Sur les troncs d'arbres et les toits de chaume. — Deurne, Wilryck, Brasschaet. F. — Très-abondant aux environs d'Anvers.

Dicranées.

Trematodon ambiguus Hornsch. — Sur la terre humide. — Gheel, entre Gheel et Oolen. — F. — Abondant.

Dicranella cerviculata Sch. — Sur la terre. — Oolen. — F.

— **varia** Sch. — Sur la terre. — Calmpthout, entre Deurne et Wyneghem. — F.

— **rufescens** Sch. — Sur la terre. — Wommelghem. — St.

— **heteromalla** Sch. — Sur la terre. — C. Camp.

Dicranum scoparium Hedw. — Sur la terre dans les bois. — C. Camp.

— — var. **orthophyllum** Br. Eur. — Sur la terre humide dans les bruyères — Calmpthout, Cappellen. — St.

— — var. **paludosum** Br. Eur. — Sur la terre humide dans les bruyères. — Vosselaer. — St.

— **palustre** La Pyl. — Sur la terre humide. — Vosselaer, Nieuwmoer (Calmpthout). — St.

— **spurium** Hedw. — Sur la terre humide ou tourbeuse. — Wuestwezel, Schilde, entre Gheel et Oolen, Vosselaer. — St.

— **undulatum** Br. Eur. — Sur la terre dans les bois. — Calmpthout, Waerloos. — St.

Dicranodontium longirostre Br. Eur. — Sur les troncs d'arbres pourris et la terre. — Waerloos, entre Deurne et Wyneghem, Duffel, Deurne. — St.

Campylopus flexuosus Brid. — Sur la terre dans les bois. — Cappellen. — St.; Brasschaet. — F.

— **fragilis** Br. Eur. — Sur la terre dans les bois. — Calmpthout. — St.

— **turfaceus** Br. Eur. — Sur la terre humide dans les bois. — Schooten, Brasschaet. — F.

— **polytrichoides** De Not. — Sables humides sur les dunes. — Camp. : abondant à Calmpthout — Espèce nouvelle pour la flore.

— **brevipilus** Br. Eur. — Sur la terre humide ou tourbeuse dans les bruyères. — Calmpthout, Wuestwezel. — St.

Leucobryées.

Leucobryum glaucum Sch. — Sur la terre dans les bois. — Schooten, Waerloos, Deurne, Cappellen, Contich, Wilryck, Gierle, Vosselaer. — St.

Fissidentées.

Fissidens bryoides Hedw. — Sur la terre et les racines d'arbres. — Deurne, Edeghem, Wilryck, Wavre-Ste-Catherine, Duffel. — F.

— **taxifolius** Hedw. — Sur la terre argileuse ombragée. — Edeghem, entre Deurne et Wyneghem. — F.; Wilryck, Merxem. — St.

— **adianthoides** Hedw. — Dans une prairie humide à Schilde. — St.

Cératodontées.

Ceratodon purpureus Brid. — Sur la terre, les troncs d'arbres, les murs, etc. — C. Camp.

Leptotrichées.

Leptotrichum tortile Hpe. — Sur la terre sablonneuse. — Oeleghem, entre Deurne et Wyneghem. — F.; entre Wyneghem et Schilde.

— **vaginans** Milde. — Sur la terre humide. — Entre Deurne et Wyneghem. — F.; Bonheyden. — St.

— **homomallum** Sch. — Sur la terre. — Cappellen, Wuestwezel. — F.; entre Oeleghem et Schilde, entre Wyneghem et Schilde.

Pottiées.

Pottia truncata Br. Eur. — Sur la terre. — Anvers, Bouchout, Wommelghem. — F.

— — var. **major** Br. Eur. (*Pottia lanceolata* C. M. var. *gymnostoma* Sch.). — Sur la terre. — Anvers. — F.

Trichostomées.

Didymodon rubellus Br. Eur. — Sur la terre à Schooten, sur un mur entre Schooten et Wyneghem. — F.

Barbula ambigua Br. Eur. — Sur la terre. — Fortifications d'Anvers. — F.

— **muralis** Br. Eur. — Sur les murs. — C., CC.

— **unguiculata** Hedw. — Sur la terre et les murs. — AC., C. Camp.

— **fallax** Hedw. — Sur la terre sablonneuse à Calmpthout. — F.; sur des blocs de rochers à Deurne. — St.

— **convoluta** Hedw. — Sur la terre et les murs. — Anvers. — F.

— **subulata** Brid. — Sur la terre sablonneuse. — Schooten, Emblehem, Wommelghem. — F.

— **laevipila** Brid. — Sur les troncs d'arbres. — Deurne, entre Anvers et Hoboken, Wilryck, Eeckeren. — F. — Abondant aux environs immédiats d'Anvers.

Barbula laevipila Brid. var. **meridionalis** Sch. (*B. laevipiliformis* De Not.). — Sur les troncs d'arbres au bord de l'Escaut, entre Anvers et Hoboken. — F.

— **latifolia** Brch. — Sur les troncs d'arbres. — Entre Wilryck et Edeghem, entre Anvers en Hoboken. — St.

— **ruralis** Hedw. — Sur un toit de chaume à Santvliet. — St.

— **ruraliformis** Besch. — Sur la terre et les pierres. — Schooten, Gheel. — St.

Obs. — Le B. *intermedia* Brid. est abondant sur les murs à Tongerloo. — F.

Grimmiées.

Grimmia apocarpa Hedw. — Sur les pierres. — Gheel. — F.

— **pulvinata** Sm. — Sur les murs, les tuiles des toits, les troncs d'arbres, etc. — C. AC., — F.

Rhacomitrium lanuginosum Brid. — Bruyères tourbeuses. — Cappellen, Nieuwmoer (Calmpthout). — St.

— **canescens** Brid. — Sur la terre. — Oeleghem. — St.

— — var. **ericoides** Br. Eur. — Sur la terre dans les bruyères et les bois. — Entre Gheel et Oolen, Bonheyden, Vosselaer. — St.

Obs. — J'ai observé le *R. heterostichum* Brid. sur un bloc de grès à Zonhoven. — St.

Zygodontées.

Zygodon viridissimus Brid. — Sur les troncs d'arbres. — Anvers, entre Anvers et Hoboken. — J'ai aussi observé cette espèce à Muyzen-lez-Malines. — St.

Orthotrichées.

Ulota Bruchii Brid. — Sur les troncs d'arbres. — Entre Ranst et Broechem. RR. — F.

Orthotrichum anomalum Hedw. — Sur les pierres. — Entre Deurne et Wyneghem. — F.

— — var. **saxatile** Wood. — Sur les pierres. — Gheel. — F. — Abondant.

— **affine** Schrad. — Sur les troncs d'arbres et les pierres. — AC., AR. — F.

— **diaphanum** Schrad. — Sur les pierres et les troncs d'arbres. — AC., AR. — F.

— **Lyellii** H. et T. — Sur les troncs d'arbres. — Deurne, Broechem. — St.

Tétraphidées.

Tetraphis pellucida Hedw. — Sur les troncs d'arbres pourris. — Waerloos. — F.

Splachnées.

Splachnum ampullaceum L. — Cappellen. — F. — J'ai aussi observé cette espèce dans les marais aux environs de Genck (Limbourg). — St.

Physcomitriées.

Physcomitrium pyriforme Brid. — Sur la terre humide. — Aertselaer, Anvers, Deurne, entre Oolen et Gheel. — F.

Funariées.

Funaria hygrometrica Hedw. — Sur la terre et les murs. — C. Camp. — F.

Bryées.

Webera nutans Hedw. — Sur la terre. - Merxem, Wommelghem, 'S Gravenwezel, Oolen, Bonheyden. — F. — AC. Camp.

— **carnea** Sch. — Sur les murs d'un pont à Schooten, sur la terre argileuse à Merxem. — F.

Bryum erythrocarpum Schw. — Sur la terre tourbeuse. — Bonheyden. — F.

— **atropurpureum** W. et M.? — Sur les murs à Anvers. — St.

— **caespititium** L. — Sur la terre et les murs. — Entre Deurne et Wyneghem, entre Merxem et Schooten, entre Schooten et Wyneghem, entre Lierre et Emblehem, Anvers, Nieuwmoer (Calmpthout). — F.

— **argenteum** L. — Sur les murs, la terre, etc. -- C. — F.

— **capillare** L. — Sur la terre, les troncs d'arbres, les murs, etc. Schooten, Wilryck, Eeckeren, Broechem. — F.; Deurne, entre Wilryck et Edeghem, entre Anvers et Hoboken. — St.

— **pseudotriquetrum** Sc. — Sur la terre tourbeuse. — Schilde. — St.

— **turbinatum** Schw. — Sur la terre. — Schooten, 'S Gravenwezel. — F.

Mnium undulatum Hedw. — Sur la terre ombragée. — Deurne, Wilryck, entre Duffel et Wavre-Ste-Catherine, entre Broechem et Oeleghem. — St.

— **rostratum** Schw. — Sur la terre ombragée. — AC. Camp. — St.

Mnium hornum L. — Sur la terre ombragée. — C. Camp. —F.
— **punctatum** Hedw. — Sur la terre humide ombragée. — Deurne, Schooten, Wilryck. — F.

Aulacomniées.

Aulacomnium androgynum Schw. — Sur les troncs d'arbres pourris et sur la terre.—Schooten, Contich, Cappellen, Wommelghem, entre Deurne et Wyneghem, entre Anvers et Hoboken, entre Duffel et Wavre-Ste-Catherine, Reeth, Oeleghem. — St.
— **palustre** Schw. — Sur la terre marécageuse. — AC. Camp. — St.

Bartramiées.

Bartramia pomiformis Hedw. — Sur la terre ombragée. — Entre Deurne et Wyneghem, Deurne, Agterbrock (Calmpthout), Brasschaet, entre Oeleghem et Schilde, entre Schilde et Wyneghem.— F.
Philonotis fontana Brid. — Sur la terre humide. — Calmpthout, Schilde, entre Oolen et Gheel. — St.
Obs. — J'ai observé au bord d'un ruisseau à Gheel une forme passant à la var. *caespitosa* (*P. caespitosa* Wils.). — St.

Polytrichées.

Atrichum undulatum P. B. — Sur la terre ombragée.— CC. Camp. — F.
— **tenellum** Br. Eur. — Sur la terre sablonneuse. — Cappellen, Emblehem. — F.
Pogonatum nanum P. B. — Sur la terre dans les bruyères. — Cappellen. — F.
— **aloides** P. B. — Sur la terre. — Merxem, Calmpthout, Oeleghem. — F. ; Cappellen. — St.
Obs. — J'ai observé sur le sol sablonneux à Schilde une forme voisine de la var. *Dicksoni* Hook. et Tayl. — F.
Polytrichum formosum Hedw. — Sur la terre ombragée. — Gierle. — F.
— **piliferum** Schreb. — Sur la terre. — Entre Oeleghem et Schilde, Anvers, Oolen. — F. ; Deurne. — St. — AC. Camp.
— **juniperinum** Hedw. — Sur la terre. — Oolen. — F. ; entre Deurne et Wyneghem. — St.
— **commune** L. — Sur la terre. — Deurne. — F.
— — var. **perigionale** Br. Eur. — Sur la terre. — Oolen, entre Oolen et Gheel, Schooten, 'S Gravenwezel, Wyneghem, Thielen, Vosselaer, Bonheyden. — F.

Fontinalées.

Fontinalis antipyretica L. — Sur des morceaux de bois dans l'Escaut entre Anvers et Hoboken. — St.

— — var. **robusta** Card. — Sur le bois submergé, les racines d'arbres et dans les fossés. — Schooten, entre Broechem et Oeleghem. — F.; Austruweel, entre Merxem et Austruweel. — St.

Cryphées.

Cryphaea heteromalla Mohr. — Sur les troncs d'arbres. — Eeckeren, entre Oorderen et Hoevenen, Hoboken. — F.

Neckérées.

Neckera complanata Sch. — Sur les troncs d'arbres. — Entre Wilryck et Edeghem, entre Broechem et Oeleghem. — St.

Homalia trichomanoides Sch. — Sur les troncs d'arbres. — Entre Wilryck et Edeghem, Wavre-Ste-Catherine, Schilde. — F. Broechem. — St.

Leucodontées.

Leucodon sciuroides Schw. — Sur les troncs d'arbres. — Deurne, entre Anvers et Hoboken, Eeckeren, entre Deurne et Wommelghem, Schilde. — St.

Leskées.

Leskea polycarpa Ehrh. — Sur les troncs d'arbres. — Deurne, Wilryck, entre Anvers et Hoboken, Wavre-Ste-Catherine. — F.

— — var. **paludosa** Sch. — Sur les troncs d'arbres. — Wilryck entre Anvers et Hoboken, Deurne. — F.

Anomodon viticulosus H. et T. — Sur les troncs d'arbres. — Wilryck. — F.; entre Anvers et Hoboken, Merxem. — St.

Thuidiées.

Thuidium tamariscinum Sch. — Sur la terre. — Schooten, Brasschaet, Wavre-Ste-Catherine, Contich, Wilryck, entre Broechem et Oeleghem, Vosselaer. — St.

Orthothéciées.

Pylaisia polyantha Sch. — Sur les troncs d'arbres. — Entre Anvers et Hoboken, Hoboken — F.

Climacium dendroides W. et M. — Dans les prairies humides. — Deurne, Schooten. — F. — AC. Camp. — St.

Isothecium myurum Brid. — Sur les troncs d'arbres et les murs. — Entre Deurne et Wyneghem, Waerloos, Broechem, Wilryck, Deurne — St.

Homalothecium sericeum Sch. — Sur les troncs d'arbres. — CC. — F.

Brachythéciées.

Brachythecium salebrosum Sch. — Sur un tronc d'arbre à Schooten. — F.

— **Mildeanum** Sch. — Sur les murs et la terre. — Entre Deurne et Wyneghem. — F.; Schooten. — St.

— **albicans** Sch. — Sur la terre et les pierres. — Calmpthout. — F.; Anvers, Cappellen, Brasschaet. — St.

— **velutinum** Sch. — Sur la terre et les troncs d'arbres pourris. — Deurne, Wilryck, Calmpthout, Wavre-Ste-Catherine. — F.

— — var. **intricatum** Sch. — Sur la terre sablonneuse à Emblehem et sur les troncs d'arbres pourris à Schooten. — F.

— **rutabulum** Sch. — Sur les troncs d'arbres, la terre, etc. — C. — F.

— — var. **longisetum** Sch.? — Sur le mur d'un pont entre Deurne et Wyneghem. — F.

— **rivulare** Sch. — Sur la terre entre Anvers et Hoboken. — St.

Eurynchiées.

Eurhynchium myosuroides Sch. — Sur la terre ombragée à Calmpthout. — St.

— **striatum** Sch. — Sur la terre et les troncs d'arbres pourris dans les bois. — Duffel. — F.; Waerloos, Wilryck, Reeth, entre Broechem et Oeleghem. — St.

— **piliferum** Sch. — Sur la terre humide ombragée. — Wilryck, Wommelghem, Deurne, Duffel, Contich. — St.

— **praelongum** Sch. — Sur la terre, les troncs d'arbres, etc. — Deurne, entre Anvers et Hoboken, Wilryck, Schooten, Edeghem. — St.

Eurhynchium Stokesii Sch. — Sur la terre et les troncs d'arbres. — Entre Deurne et Wyneghem, entre Deurne et Wommelghem, Wilryck, Wavre-Ste-Catherine. — F. — C. Camp. — St.

— **pumilum** Sch. — Dans les bois et sur les troncs d'arbres isolés. — Entre Waerloos et Duffel, entre Anvers et Hoboken. — St.

Rhynchostegium tenellum Sch. — Sur un mur à Eeckeren. — F.

— **confertum** Sch. — Sur les troncs d'arbres entre Anvers et Hoboken. — F.

— **murale** Sch. — Sur les troncs d'arbres entre Anvers et Hoboken. — F.

Obs. — J'ai observé le *R. rusciforme* Sch. sur une pierre, au bord d'une source, aux environs de Diepenbeek (Limbourg). — St.

Hypnées.

Plagiothecium latebricola Sch. — Dans un bois entre Waerloos et Duffel. — St.

— **Schimperi** Jur. et Mil. — Sur la terre sablonneuse ombragée à Reeth. — St.

— **sylvaticum** Sch. — Sur la terre et les troncs d'arbres pourris. — Wilryck, Deurne, entre Waerloos et Duffel, entre Reeth et Waerloos. — F.; entre Broechem et Oeleghem. — St.

— **undulatum** Sch. — Sur la terre et les troncs d'arbres pourris dans les bois. — Schooten, Waerloos, Deurne, Brasschaet. — St.

— **silesiacum** Sch. — Sur les troncs d'arbres. — Edeghem, Wilryck, Duffel, Waerloos, Schilde. — F.

Amblystegium serpens Sch. — Sur les troncs d'arbres et la terre. — Entre Anvers et Hoboken, Wilryck, Contich, Aertselaer, Waerloos, Cappellen, Deurne, Eeckeren. — F.; Nieuwmoer (Calmpthout). — St.

— **radicale** Sch. — Sur les racines d'arbres dans un bois humide à Oeleghem. — F.

— **Kochii** Sch. — Dans une mare entre Anvers et Hoboken. — St.

— **riparium** Sch. — Sur le bois pourri, les racines d'arbres, etc. — Deurne, entre Anvers et Hoboken, entre Lierre et Emblehem, Schooten. — F.

— — var. **longifolium** Sch. — Sur les racines d'arbres aux bords des fossés à Deurne. — F.

Obs. — J'ai observé, entre Deurne et Wyneghem, une forme passant à la var. *subsecundum* Sch. — St.

Hypnum stellatum Sch. — Sur la terre humide. — Schilde, Vosselaer. — St.

— **aduncum** Hedw. — Dans les prairies humides et les fossés. — Nieuwmoer (Calmpthout). — F. ; entre Deurne et Wommelghem. — St.

— — var. **laxum** Sch. (*H. Kneiffii* B. S. var. *laxum* Sch.). — Dans une mare entre Anvers et Hoboken. — St

— **vernicosum** Lindb. — Dans une prairie marécageuse à Gheel. — St.

— **revolvens** Sw. — Dans une mare à Vosselaer. — F. — Très-abondant.

— **Sendtneri** Schimp. — Dans les prairies marécageuses à Oeleghem. — St.

— **fluitans** L. — Bords des mares, des fossés et des étangs. — Calmpthout. — F. ; Hoboken, Anvers, Wuestwezel, Vosselaer. — St.

— **uncinatum** Hedw. — Sur la terre dans les mares et les fossés. — Entre Broechem et Emblehem. — F. ; Schilde. — St.

— **imponens** Hedw. — Sur la terre dans les bruyères. — Schilde, entre Oolen et Gheel. — St.

— **cupressiforme** L. — Sur les troncs d'arbres et la terre. — C.

— — var. **filiforme** Brid. — Sur les troncs d'arbres à Cappellen — F.

— — var. **ericetorum** Sch. — Dans les bruyères. — Schilde. — St.

Obs. — J'ai observé une forme voisine de la var. *ericetorum* Sch. dans les marais à Nieuwmoer (Calmpthout). — St.

— **arcuatum** Lindb. — Sur la terre dans les bois. — Entre Brasschaet et Schooten, entre Gierle et Vosselaer. — St

— **cordifolium** Hedw. — Sur la terre humide ou marécageuse. — Entre Oolen et Gheel. — F. ; Deurne, Vosselaer. — St. — J'ai aussi observé cette espèce à Muyzen-lez-Malines. — St.

— **giganteum** Sch — Dans les fossés. — Oeleghem, Austruweel. — St.

— **cuspidatum** L. — Sur la terre humide. — Hoboken, Schooten, entre Oolen et Gheel. — F. — C. Camp. — St.

— **Schreberi** Willd. — Sur la terre ombragée. — Calmpthout. — F. — AC Camp. — St.

— **purum** L. — Sur la terre — C. Camp. — St.

— **stramineum** Dicks. — Dans les marais et les prairies humides. — Nieuwmoer (Calmpthout). — F. ; Gheel, Vosselaer. — St.

— **scorpioides** L. — Dans les mares. — Gheel, Vosselaer. — St.

Hylocomium splendens Sch. — Sur la terre dans les bois et les prairies. — Schooten, entre Deurne et Wyneghem, entre Gierle et Vosselaer. — St.

Hylocomium splendens Sch. var. **gracilius** Boul. — Prairie humide à Schilde.

— **squarrosum** Sch. — Sur la terre humide dans les prairies, etc. — C. Camp. — St.

— **triquetrum** Sch. — Sur la terre ombragée. — Edeghem, Broechem, Contich, Wilryck, entre Gierle et Vosselaer. — St.

— **loreum** Sch. — Sur le sol dans un bois à Hoboken. — St.

Sphaignes.

Sphagnum acutifolium Ehrh. — Aux bords des marais et des fossés et dans les bois. — Nieuwmoer (Calmpthout), Vosselaer. — F.

— — var. **squarrosulum** Warn. — Au bord d'un fossé ombragé à Calmpthout. — St.

— — var. **Schimperi** Warn. — Dans un bois à Schooten. — St.

— **fimbriatum** Wils. — Aux bords des fossés et dans les bois humides. — Schooten, Eeckeren, Oeleghem, Hoboken, Calmpthout. — St.

— **recurvum** P. B. — Marais et fossés dans les bois. — Cappellen, Oeleghem. — St.

— — var. **tenue** Kling. — Dans une prairie humide à Herenthals. — F.

— **cuspidatum** Ehrh. — Dans les marais et les fossés. — Vosselaer. — F.; entre Wyneghem et Schilde. — St.

— — var. **falcatum** Russ. — Dans les fossés à Calmpthout. — St.

— — var. **plumosum** Sch. — Dans les fossés à Nieuwmoer (Calmpthout). — St.

— **squarrosum** Pers. — Dans les marais, les prairies et les bois humides. — Oeleghem. — F.; entre Herenthals et Gheel. — St.

— — var. **imbricatum** Sch. — Dans un bois humide à Oeleghem. — St.

— **teres** Angstr. var. **squarrosulum** Lesq. — Dans une prairie humide à Herenthals. — F.

— **rigidum** Sch. — Dans les marais, aux bords des fossés et dans les bois humides. — Calmpthout. — F.; Schooten, Bouheyden. — St.

— — var. **squarrosum** Russ. — Schooten, Herenthals. — St.

— — var. **compactum** Sch. — Nieuwmoer (Calmpthout). — F.; Cappellen, Wuestwezel. — St. — J'ai observé une forme passant à cette variété, aux bords d'un fossé à Oolen. — F.

— **molle** Sull. — Dans les marais, les bruyères humides et

les bois. — Schooten, Nieuwmoer (Calmpthout). — F.; Bonheyden. — St. — J'ai aussi observé cette espèce à Vieux-Turnhout. — F.

Sphagnum molle Sull. var. **compactum** Grav — Bruyères humides à Nieuwmoer (Calmpthout). — F.; dans les marais à Calmpthout. — St.

— **subsecundum** N. et H. — Dans les marais et les fossés. — Vosselaer, Nieuwmoer (Calmpthout). — F.

— — var. ~~simplicissimum Milde.~~ (*contortum* Sch.). — Dans les fossés à Nieuwmoer (Calmpthout), Wuestwezel, Brasschaet. — St.

— — var. **obesum** Wils. — Dans les fossés à Nieuwmoer (Calmpthout), Wuestwezel, Brasschaet, Calmpthout. — St.

— — var. **fluitans** Grav. — Dans un fossé à Wuestwezel. — St.

— — var. **squarrosulum** Grav. — Aux bords des fossés à Nieuwmoer (Calmpthout). — St.

— — var. **auriculatum** Lindb. — Au bord d'un fossé à Wuestwezel et dans les marais à Bonheyden. — St.

— **laricinum** R. spr. var. — J'ai observé, dans une mare tourbeuse à Schilde, une forme tenant le milieu entre les var. *platyphyllum* Lindb. et *subsimplex* Lindb. — St.

— **molluscum** Brch. — Dans les bruyères humides. — Vosselaer. — F.; Nieuwmoer (Calmpthout), Wuestwezel, Calmpthout, Turnhout. — St.

Obs. — J'ai observé une forme voisine de la var. *immersum* Sch. dans un fossé à Calmpthout. — F.

— **cymbifolium** Ehrh. — Dans les bruyères et les bois humides et aux bords des fossés. — Oeleghem, Calmpthout, Herenthals. — F.; Schooten, Cappellen, Wuestwezel. — St.

— — var. **purpurascens** Russ. – Dans les fossés à Cappellen. — St.

— — **squarrosulum** N. et H. — Dans un bois humide à Hoboken. — St.

— **papillosum** Lindb. — Dans les fossés, les marais et les mares. — Entre Cappellen et Calmpthout. — F.; Wuestwezel. — St.

— — var. **confertum** Lindb. — Dans les marais à Wuestwezel. — St.

— — **brachycladum** Card. — Dans une mare à Nieuwmoer (Calmpthout). — F.

HÉPATIQUES.

Gymnomitriées.

Sarcoscyphus emarginatus Boul. — Sur la terre sablonneuse dans un bois à Wuestwezel.

Alicularia scalaris Cord. — Sur la terre. — Cappellen, Wuestwezel, Gierle, Vosselaer, entre Herenthals et Oolen.

Jungermanniées.

Scapania compacta Lindb. — Sur la terre sablonneuse. — Calmpthout, Brasschaet, Wuestwezel.

— **irrigua** N. ab E. — Dans les bruyères à Gheel.

— **nemorosa** N. ab E. — Sur la terre. — Entre Oeleghem et Schilde, Vosselaer, entre Broechem et Emblehem, Calmpthout.

Jungermannia albicans L. — Sur la terre ombragée. — C. Camp.

— **exsecta** Schmied. — Sur la terre sablonneuse ombragée. — Calmpthout.

— **Schraderi** Mart. — Sur la terre humide dans les bois entre Cappellen et Calmpthout.

— **crenulata** Sm. — Sur la terre. — Oeleghem, Cappellen, Wuestwezel, Schooten, entre Schilde et Wyneghem.

— — var. **gracillima** Nees. — Sur la terre. — Wilryck, Wuestwezel, Bouchout.

— **inflata** Huds. — Sur la terre dans les bruyères humides et les marais. — Cappellen, Calmpthout, entre Wyneghem et Schilde, Wuestwezel, Schilde, Gheel.

— **ventricosa** Dicks — Sur la terre sablonneuse. — Calmpthout, Eeckeren.

— **bicrenata** Lindenb. — Sur la terre sablonneuse dans les bois à Cappellen.

— **incisa** Schrad. — Sur la terre ombragée. — Entre Oeleghem et Schilde, entre Gierle et Vosselaer.

— **Starkei** N. ab E. — Sur la terre. — Entre Deurne et Wyneghem, Wommelghem, Bouheyden.

— **bicuspidata** L. — Sur la terre et les troncs d'arbres pourris. — Cappellen, Calmpthout, Wuestwezel, Deurne, Eeckeren, Schilde, Bouheyden.

Jungermannia bicuspidata L. var. **ericetorum** Nees. — Sur la terre tourbeuse à Bonheyden.

— **setacea** Web. var. **sertulacoides** Nees. — Dans les touffes de Sphaignes à Nieuwmoer (Calmpthout).

Lophocolea bidentata N. ab E. — Sur la terre, les troncs d'arbres pourris, etc. — AC. Camp.

— **heterophylla** N. ab E. — Sur la terre, les troncs d'arbres, etc. — Deurne, Wilryck, Bouchout, Wommelghem, Duffel.

Chiloscyphus polyanthus N. ab E. — Dans un bois à Deurne.

Géocalycées.

Calypogeia trichomanis Corda. — Sur la terre et dans les touffes de Sphaignes. — Calmpthout, Wilryck, Bouchout, Wavre-Ste-Catherine, Wuestwezel, entre Gierle et Vosselaer, Schilde, Waerloos, Bonheyden.

— **arguta** N. ab E. — Sur la terre dans les bois. — Wilryck et entre Wilryck et Edeghem.

Lépidoziées.

Lepidozia reptans Lind. et G. — Sur la terre dans les bois. — Schooten, Cappellen, entre Gierle et Vosselaer.

Ptilidées.

Ptilidium ciliare N. ab E. var. **ericetorum** N. ab E. — Dans les bruyères. — Schilde.

Platyphyllées.

Radula complanata Dmrt. — Sur les troncs d'arbres. — Eeckeren, Wavre-Ste-Catherine, entre Oeleghem et Schilde.

Madotheca platyphylla Dmrt. — Sur les troncs d'arbres. — Wilryck, Schilde.

Jubulées.

Frullania dilatata N. ab E. — Sur les troncs d'arbres. — Deurne, Wilryck, Eeckeren, Bouchout, entre Anvers et Hoboken, Brasschaet, Wavre-Ste-Catherine.

Codoniées

Fossombronia Dumortieri Ldb. (*F. angulosa* var. *Dumortieri* Husnot). — Aux bords des marais desséchés. — Cappellen, Turnhout.

Haplolénées.

Pellia epiphylla N. ab E. — Sur la terre ombragée. — Reeth, Wilryck, Wuestwezel, Oeleghem.

Blasia pusilla N. ab E. — Sur la terre humide. — Calmpthout, Bouchout, Wyneghem, Duffel, entre Reeth et Contich, entre Broechem et Emblehem, Waerloos, entre Herenthals et Oolen.

Aneurées.

Aneura multifida Dmrt. — Sur la terre humide à Edeghem.

Metzgériées.

Metzgeria furcata. N. ab E. — Sur les troncs d'arbres et la terre. — Wilryck, Deurne, Eeckeren, Broechem, Calmpthout, Schilde.

— — var. **prolifera** N. ab E. — Sur un tronc d'arbre à Waerloos.

Marchantiées

Marchantia polymorpha L. — Dans les marais et sur le bois pourri. — Entre Lierre et Emblehem, Gheel.

Fegatella conica Cord. — Sur la terre humide et les pierres. — Deurne, Schooten.

Sphaerocarpus Michelii Bell. — Sur la terre. — Entre Deurne et Wyneghem, Contich, Bouchout, Duffel.

Ricciées.

Riccia glauca L. — Sur la terre. — Contich, Duffel, Reeth

— **crystallina** L. — Sur la terre humide à Anvers.

— **fluitans** L. — Dans les fossés. — Entre Oolen et Herenthals, Deurne.



